

2013

Liste rouge de la flore vasculaire d'Auvergne



Présentation de la liste rouge

Celle-ci suit les préconisations de l'UICN :

- présentation de tous les taxons évaluables (sont donc exclus les taxons exogènes et les taxons d'indigénat trop douteux) ; de même, dans le cas de taxons pouvant être à la fois exogènes et indigènes, cotation uniquement des populations indigènes du taxon ;
- présentation des taxons au niveau spécifique et de certaines sous-espèces et variétés présentant une valeur patrimoniale ou porteuses d'enjeux particuliers.

Les hybrides très majoritairement méconnus en Auvergne n'ont pas été évalués et ne figurent donc pas dans cette liste.



Bilan

Sur les **4368 taxons de tous rangs taxonomiques, indigènes ou exogènes**, que comporte le catalogue de la flore vasculaire d'Auvergne, seuls les taxons indigènes (ou d'indigénat incertain) ont été cotés dans le cadre de ce programme.

La liste rouge *sensu stricto* présente donc au final 2 053 taxons (dont 2026 espèces et 27 taxons de rang infraspécifique). Parmi ces 2053 taxons, 81 taxons n'ont pas été évalués (cotation NE), notamment pour des problèmes d'ordre taxonomique ou en raison de leur présence non confirmée en Auvergne. **Le bilan présenté ci-après porte donc sur 1972 taxons (dont 1945 espèces et 27 taxons de rang infraspécifique).**

Catégorie UICN	Nombre d'espèces évaluées	Proportion	Nb de sous-espèces et variétés présentant un enjeu patrimonial	
EX	Éteinte au niveau mondial	0	0 %	0
EW	Éteinte à l'état sauvage	0	0 %	0
RE	Disparue au niveau régional	36	2 %	2
CR	En danger critique	114 (dont 18 espèces cotées CR*, non revues récemment)	6 %	4 (dont 3 infrataxons cotés CR*, non revus récemment)
EN	En danger	160	8 %	5
VU	Vulnérable	127	7 %	9
NT	Quasi menacée	126	6 %	7
LC	Préoccupation mineure	1152	59 %	0
DD	Données insuffisantes	230	12 %	0
Total		1945	100 %	27

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Abies alba</i> Mill.	I	743	37,03	C	LC					
<i>Acer campestre</i> L.	I	782	33,73	CC	LC					
<i>Acer monspessulanum</i> L.	I	39	96,69	R	LC		03 ; 63			La cotation correspond à la subsp. <i>monspessulanum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Acer platanoides</i> L.	I	637	46,02	C	LC					
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	I	761	35,51	CC	LC					
<i>Achillea millefolium</i> L.	I	1180	0,00	CC	LC					
<i>Achillea ptarmica</i> L.	I	445	62,29	C	LC					
<i>Aconitum burmatii</i> Gáyer	I	2	99,83	E	VU	D1+2	43		X	
<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	I	101	91,44	PC	LC		43			
<i>Aconitum napellus</i> L.	I	52	95,59	AR	LC		43		X	
<i>Actaea spicata</i> L.	I	234	80,17	AC	LC					
<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay	I	5	99,58	E	NT	pr. B2a D2	15		X	La cotation correspond à la subsp. <i>lainzii</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern.	I	84	92,88	AR	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>alliariae</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	I	2	99,83	E	CR	D	03 ; 15		X	
<i>Adonis aestivalis</i> L.	I	37	96,86	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15		X	La cotation correspond à la subsp. <i>aestivalis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Adonis annua</i> L.	I	35	97,03	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43		X	La cotation correspond à la var. <i>annua</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Adonis flammea</i> Jacq.	I	27	97,71	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63		X	
<i>Adoxa moschatellina</i> L.	I	610	48,31	C	LC					
<i>Aegilops triuncialis</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X	
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	I	251	78,73	AC	LC					
<i>Aethusa cynapium</i> L.	I	627	46,86	C	LC					
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	I	727	38,39	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>eupatoria</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	I	246	79,15	AC	LC					
<i>Agrostemma githago</i> L.	I	89	92,46	PC	NT	pr. B2b(iii)	03		X	
<i>Agrostis alpina</i> Scop.	I	0	100,00	D?	RE					
<i>Agrostis canina</i> L.	I	653	44,66	C	LC					
<i>Agrostis capillaris</i> L.	I	1115	5,51	CC	LC					
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	I	52	95,59	AR	LC		43 ; 63			
<i>Agrostis marysae-tortiae</i> Portal	I	3	99,75	E	NT	pr. B2a	43			
<i>Agrostis rupestris</i> All.	I	16	98,64	RR	LC		63			
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	I	816	30,85	CC	LC					
<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	I	22	98,14	R	DD					
<i>Aira caryophyllea</i> L.	I	851	27,88	CC	LC				X	Seule la subsp. <i>multiculmis</i> était citée dans la liste rouge régionale précédente
<i>Aira praecox</i> L.	I	251	78,73	AC	LC					
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	I	57	95,17	AR	LC		15 ; 43			
<i>Ajuga genevensis</i> L.	I	169	85,68	PC	LC					
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	I	14	98,81	RR	VU	D2	15 ; 63			
<i>Ajuga reptans</i> L.	I	1052	10,85	CC	LC					
<i>Alchemilla amphisericea</i> Buser	I	7	99,41	RR	NT	pr. D1	15		X	X
<i>Alchemilla chirophylla</i> Buser	I	22	98,14	R	LC		43 ; 63			
<i>Alchemilla conjuncta</i> Bab.	I?	2	99,83	E	NE					
<i>Alchemilla connivens</i> Buser	I?	2	99,83	E	NE					
<i>Alchemilla coriacea</i> Buser	I?	134	88,64	PC	NE					
<i>Alchemilla exigua</i> Buser ex Paulin	I?	1	99,92	E	NE					
<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser	I	25	97,88	R	LC		15 ; 43 ; 63			
<i>Alchemilla flabellata</i> Buser	I	27	97,71	R	LC		15			
<i>Alchemilla flavovirens</i> Buser	I?	0	100,00	D?	NE					
<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	I	265	77,54	AC	LC		03			
<i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr.	I	61	94,83	AR	LC		03			
<i>Alchemilla grenieri</i> J.Guillot	I	21	98,22	R	LC		15 ; 63	Endémique Massif central	X	
<i>Alchemilla hybrida</i> (L.) L.	I	31	97,37	R	LC		43 ; 63			
<i>Alchemilla inconcinna</i> Buser	I	10	99,15	RR	DD					
<i>Alchemilla lucida</i> Buser	I?	8	99,32	RR	NE					
<i>Alchemilla monticola</i> Opiz	I	85	92,80	AR	LC		43			
<i>Alchemilla pallens</i> Buser	I	9	99,24	RR	NE					

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Alchemilla reniformis</i> Buser	I?	0	100,00	D?	NE					
<i>Alchemilla rhododendrophila</i> Buser	I?	1	99,92	E	NE					
<i>Alchemilla saxatilis</i> Buser	I	67	94,32	AR	LC					
<i>Alchemilla strigosula</i> Buser	I?	0	100,00	D?	NE					
<i>Alchemilla subcrenata</i> Buser	I?	0	100,00	D?	NE					
<i>Alchemilla transiens</i> (Buser) Buser	I	54	95,42	AR	LC					
<i>Alchemilla vetteri</i> Buser	I	2	99,83	E	NT	VU (D1) (-1)	43			
<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	I	361	69,41	AC	LC		03			
<i>Alisma lanceolatum</i> With.	I	72	93,90	AR	LC		43			
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	I	346	70,68	AC	LC					
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	I	1003	15,00	CC	LC					
<i>Allium consimile</i> Jord. ex Gren.	I?	3	99,75	E	NE			EN	Identité à confirmer cependant en Auvergne	
<i>Allium ericetorum</i> Thore	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	15		X	
<i>Allium flavum</i> L.	I	11	99,07	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63		X X	
<i>Allium longispathum</i> D.Delaroche	I?	2	99,83	E	NE				X	
<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	I	27	97,71	R	LC		43 ; 63		X	
<i>Allium oleraceum</i> L.	I	227	80,76	AC	LC					
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	I?	27	97,71	R	DD					
<i>Allium scorodoprasum</i> L.	I?	10	99,15	RR	NE					
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	I	134	88,64	PC	LC		03			
<i>Allium ursinum</i> L.	I	213	81,95	AC	LC					
<i>Allium victorialis</i> L.	I	61	94,83	AR	LC		03 ; 43			
<i>Allium vineale</i> L.	I	465	60,59	C	LC					
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	I	1040	11,86	CC	LC					
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	I	137	88,39	PC	LC					
<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	I?	7	99,41	RR	VU	D2	63		X	
<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	I?	0	100,00	D?	RE					
<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	I	232	80,34	AC	LC					
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	I	223	81,10	AC	LC		15			
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	I	858	27,29	CC	LC					
<i>Althaea cannabina</i> L.	I	11	99,07	RR	VU	D2	63		X	
<i>Althaea hirsuta</i> L.	I	82	93,05	AR	LC		15			
<i>Althaea officinalis</i> L.	I	117	90,08	PC	LC		43			
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	I	175	85,17	PC	LC					
<i>Alyssum montanum</i> L.	I?	1	99,92	E	NE					
<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi	I?	7	99,41	RR	NT	pr. D2	15 ; 43 ; 63			
<i>Amaranthus blitum</i> L.	I?	326	72,37	AC	LC					
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	I	147	87,54	PC	LC		03			
<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	35	97,03	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63	X X	La cotation correspond à la subsp. <i>coriophora</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne	
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	20	98,31	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63		X	
<i>Anacamptis morio</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	383	67,54	C	LC					
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	0	100,00	D?	RE					
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	I	83	92,97	AR	LC					La cotation correspond à la var. <i>pyramidalis</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	I	318	73,05	AC	LC					
<i>Anchusa italica</i> Retz.	I	22	98,14	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43			
<i>Andromeda polifolia</i> L.	I	46	96,10	AR	NT	pr. B2b(iii)	03		X X	
<i>Androsace elongata</i> L.	I?	7	99,41	RR	CR	B2ab(i,ii, iii, iv)	63	EN	X X	La cotation correspond à la subsp. <i>breistrofferi</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Androsace halleri</i> L.	I	18	98,47	R	LC		43 ; 63		X X	
<i>Androsace maxima</i> L.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	43		X	
<i>Andryala integrifolia</i> L.	I	281	76,19	AC	LC					
<i>Anemone nemorosa</i> L.	I	773	34,49	CC	LC					
<i>Anemone ranunculoides</i> L.	I	39	96,69	R	LC		43		X	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	I	935	20,76	CC	LC					
<i>Anogramma leptophyllum</i> (L.) Link	I	6	99,49	RR	VU	D2	03 ; 15		X	
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	I	69	94,15	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03			

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Anthemis arvensis</i> L.	I	166	85,93	PC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>arvensis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Anthemis cotula</i> L.	I	185	84,32	AC	LC							
<i>Anthemis saxatilis</i> DC. ex Willd.	I	24	97,97	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63					La cotation correspond à la var. <i>saxatilis</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Anthericum liliago</i> L.	I	121	89,75	PC	LC							
<i>Anthericum ramosum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15			X		
<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	I	16	98,64	RR	VU	D2	15					
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	I	1076	8,81	CC	LC							
<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb.	I	92	92,20	PC	LC			15				
<i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl.	I	7	99,41	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63					
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	I	862	26,95	CC	LC							
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	I	342	71,02	AC	LC							Taxon, représenté en Auvergne par plusieurs sous-espèces (dont la subsp. <i>praepropera</i>), et dont les populations sont indigènes ou exogènes.
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>praepropera</i> (A.Kern.) Bornm.	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	I	14	98,81	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 63			X		
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	I	466	60,51	C	LC							
<i>Aphanes arvensis</i> L.	I	502	57,46	C	LC							
<i>Aphanes australis</i> Rydb.	I	204	82,71	AC	LC							
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	I	598	49,32	C	LC							
<i>Arabis thaliana</i> (L.) Heynh.	I	935	20,76	CC	LC							
<i>Arabis alpina</i> L.	I	31	97,37	R	LC		63					
<i>Arabis auriculata</i> Lam.	I?	2	99,83	E	DD							
<i>Arabis cebennensis</i> DC.	I	28	97,63	R	LC		43	Endémique Massif central		X		
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	I	136	88,47	PC	LC		03					
<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb.	I	0	100,00	D?	DD							
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	I	7	99,41	RR	DD							
<i>Arabis turrata</i> L.	I	67	94,32	AR	LC		03					
<i>Arctium lappa</i> L.	I	511	56,69	C	LC							
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	I	705	40,25	C	LC							
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	I	16	98,64	RR	LC		15 ; 43		X	X		La cotation correspond à la var. <i>crassifolius</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	I	783	33,64	CC	LC							
<i>Aristolochia clematitidis</i> L.	I	34	97,12	R	LC		03					
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.	I	317	73,14	AC	LC							
<i>Arnica montana</i> L.	I	246	79,15	AC	LC		03					La cotation correspond à la subsp. <i>montana</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Arnoseric minima</i> (L.) Schweigg. & Korte	I	177	85,00	PC	LC							
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl	I	1135	3,81	CC	LC							
<i>Artemisia alba</i> Turra	I	5	99,58	E	EN	B2ab(iii)	43 ; 63			X		
<i>Artemisia campestris</i> L.	I	143	87,88	PC	LC		03					
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	I	1046	11,36	CC	LC							
<i>Arum italicum</i> Mill.	I	67	94,32	AR	LC		15 ; 43					La cotation correspond à la var. <i>italicum</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Arum maculatum</i> L.	I	777	34,15	CC	LC							
<i>Asarina procumbens</i> Mill.	I	11	99,07	RR	VU	D1	15	Endémique franco-ibérique	X	X		
<i>Asarum europaeum</i> L.	I	22	98,14	R	LC		15			X		La cotation correspond à la subsp. <i>europaeum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Asperula arvensis</i> L.	I	1	99,92	E	RE		43			X		
<i>Asperula cynanchica</i> L.	I	294	75,08	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>cynanchica</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Asphodelus albus</i> Mill.	I	56	95,25	AR	LC		03 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>albus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	I	567	51,95	C	LC							Taxon représenté en Auvergne par la var. <i>adiantum-nigrum</i> (fréquente) et la var. <i>silesiacum</i> (menacée)
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. var. <i>silesiacum</i> (Milde) Milde	I	3	99,75	E	EN	D	43					
<i>Asplenium ceterach</i> L.	I	336	71,53	AC	LC							
<i>Asplenium foreziense</i> O.Le Grand	I	36	96,95	R	EN	B2ab(i, ii, iv)	03 ; 63		X	X		
<i>Asplenium obovatum</i> Viv.	I	5	99,58	E	EN	D	15			X		La cotation correspond à la subsp. <i>billotii</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	I	525	55,51	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>ruta-muraria</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	I	121	89,75	PC	LC							
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	I	562	52,37	C	LC							

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	I	884	25,08	CC	LC					Taxon représenté en Auvergne par plusieurs infrataxons (plus ou moins fréquents et parfois méconnus), dont la subsp. <i>pachyrachis</i> (menacée)
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>pachyrachis</i> (H.Christ) Lovis & Reichst.	I	7	99,41	RR	VU	D1	03 ; 43 ; 63		X	
<i>Asplenium viride</i> Huds.	I	11	99,07	RR	VU	D1	15 ; 63		X X	
<i>Aster amellus</i> L.	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	03 ; 15 ; 63		X X	
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	I	357	69,75	AC	LC					
<i>Astragalus hamosus</i> L.	I?	6	99,49	RR	CR	B2ab(i,ii,iii,iv)	43 ; 63		X	
<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	I	10	99,15	RR	VU	D2	63		X	
<i>Astrantia major</i> L.	I	97	91,78	PC	LC		43			La cotation correspond à la subsp. <i>major</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Astrantia minor</i> L.	I	1	99,92	E	CR	D	15		X	
<i>Athyrium distentifolium</i> Tausch ex Opiz	I	25	97,88	R	LC		03 ; 15 ; 43 ; 63			
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	I	959	18,73	CC	LC					
<i>Atriplex patula</i> L.	I	828	29,83	CC	LC					
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	I	151	87,20	PC	LC		15			La cotation correspond à la subsp. <i>prostrata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Atriplex rosea</i> L.	I	2	99,83	E	DD					
<i>Atropa belladonna</i> L.	I	11	99,07	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63		X	
<i>Avena sativa</i> L.	I	550	53,39	C	LC					Pour partie indigène en Auvergne (subsp. <i>fatua</i>). La cotation concerne donc uniquement cette sous-espèce
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	I	258	78,14	AC	LC		03			La cotation correspond à la subsp. <i>pratensis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	I	586	50,34	C	LC					
<i>Avenula versicolor</i> (Vill.) Lainz	I	16	98,64	RR	LC		15 ; 63			La cotation correspond à la subsp. <i>versicolor</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	I	12	98,98	RR	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	03 ; 63		X	
<i>Ballota nigra</i> L.	I	343	70,93	AC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>meridionalis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	I	517	56,19	C	LC					
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	I	484	58,98	C	LC					
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	I	586	50,34	C	LC					
<i>Bartsia alpina</i> L.	I	16	98,64	RR	LC				X X	
<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	I	18	98,47	R	LC		43			
<i>Bellis perennis</i> L.	I	943	20,08	CC	LC					
<i>Berberis vulgaris</i> L.	I	46	96,10	AR	LC		03			
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	03 ; 63			La majorité des données se rapporte à des plantes cultivées (subsp. <i>vulgaris</i>), la cotation concerne donc uniquement la sous-espèce apparemment indigène (subsp. <i>maritima</i>) qui n'a pas été revue depuis longtemps
<i>Beta vulgaris</i> L.	I?	46	96,10	AR	RE					
<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang.	I?	0	100,00	D?	RE					
<i>Betula nana</i> L.	I	6	99,49	RR	VU	D1	43		NT X X	
<i>Betula pendula</i> Roth	I	930	21,19	CC	LC					
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	I	233	80,25	AC	LC					
<i>Bidens cernua</i> L.	I	152	87,12	PC	LC		15			
<i>Bidens radiata</i> Thuill.	I	16	98,64	RR	VU	D2	03 ; 43 ; 63		X	
<i>Bidens tripartita</i> L.	I	532	54,92	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>tripartita</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Bifora radians</i> M.Bieb.	I?	44	96,27	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43			Indigénat à confirmer en Auvergne
<i>Biscutella arvensis</i> Jord.	I	21	98,22	R	LC		43 ; 63	Endémique Massif central	NT X X	
<i>Biscutella granitica</i> Boreau ex Pérard	I	9	99,24	RR	LC			Endémique Massif central	X	Taxon à rapporter actuellement à <i>B. lamottei</i> au sens large, lui-même inclus dans <i>B. lima</i> au sens large (d'où une cotation globalisée pour ces deux taxons)
<i>Biscutella lamottei</i> Jord.	I	19	98,39	R	LC			Endémique Massif central	X X	Taxon à rapporter actuellement à <i>B. lamottei</i> au sens large, lui-même inclus dans <i>B. lima</i> au sens large (d'où une cotation globalisée pour ces deux taxons)
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	I	24	97,97	R	LC		03 ; 15 ; 43 ; 63			La cotation correspond à la subsp. <i>perfoliata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	I	347	70,59	AC	LC					
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	I	16	98,64	RR	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	15 ; 43 ; 63			

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques	
	I	29	97,54	R	NT	pr. D2	43		X	Taxon représenté en Auvergne a priori par deux sous-espèces, la subsp. <i>maritimus</i> (correspondant certainement au taxon présent dans les sources salées), menacée et la subsp. <i>cymosus</i> (taxon non halophile correspondant certainement au moins en partie au taxon présent notamment dans la vallée de l'Allier), quasi-menacée mais a priori méconnue	
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	I	6	99,49	RR	NT	pr. D2	03		X		
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla subsp. <i>cymosus</i> (Rchb.) Soják	I	8	99,49	RR	VU	D2	03 ; 43 ; 63		X		
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	I	60	94,92	AR	LC		03 ; 15				
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	I	47	96,02	AR	LC		03 ; 15				
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	I	32	97,29	R	NT	pr. B2b (ii) D1	63				
<i>Botrychium matricarifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch	I	2	99,83	E	CR*			VU	X	X	Apparemment non revu récemment
<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	15				
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	I	446	62,20	C	LC						
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	I	776	34,24	CC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>sylvaticum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Briza media</i> L.	I	870	26,27	CC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>media</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Briza minor</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15		X		
<i>Bromus arvensis</i> L.	I	146	87,63	PC	LC		15				
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	I	82	93,05	AR	LC		03 ; 43				
<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	I	205	82,63	AC	LC						
<i>Bromus diandrus</i> Roth	I	16	98,64	RR	NT	pr. D1	15 ; 43 ; 63				
<i>Bromus erectus</i> Huds.	I	290	75,42	AC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>erectus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	I	1056	10,51	CC	LC						
<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	I	15	98,73	RR	NT	pr. D2	15 ; 43 ; 63		X		
<i>Bromus racemosus</i> L.	I	133	88,73	PC	LC		03				
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	I	167	85,85	PC	LC						
<i>Bromus secalinus</i> L.	I	203	82,80	AC	LC						
<i>Bromus squarrosus</i> L.	I	21	98,22	R	NT	pr. D2	15 ; 63				
<i>Bromus sterilis</i> L.	I	1044	11,53	CC	LC						
<i>Bromus tectorum</i> L.	I	275	76,69	AC	LC						
<i>Bryonia cretica</i> L.	I	799	32,29	CC	EN						La cotation correspond à la subsp. <i>dioica</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Bufoia paniculata</i> Dubois ex Delarbre	I	14	98,81	RR	LC	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63	X	X		
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst.	I	228	80,68	AC	LC						
<i>Buglossoides purpureoaeulea</i> (L.) I.M.Johnst.	I	23	98,05	R	EN	B2ab(i, ii, iv)	03 ; 15 ; 43				
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	I	86	92,71	AR	LC		03				
<i>Bupleurum baldense</i> Turra	I	13	98,90	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63		X		
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	I	132	88,81	PC	LC		15				La cotation correspond à la subsp. <i>falcatum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Bupleurum gerardii</i> All.	I	1	99,92	E	EN	D	03	NT	X		
<i>Bupleurum longifolium</i> L.	I	6	99,49	RR	EN	B2ab(i, ii, iv)	15 ; 63		X		
<i>Bupleurum praealtum</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D	15		X		
<i>Bupleurum ranunculooides</i> L.	I	10	99,15	RR	NT	pr. B2a	15 ; 63		X		La cotation correspond à la subsp. <i>ranunculooides</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	I	40	96,61	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03		X		
<i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng.	?	1	99,92	E	NE			EN	X		
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X		
<i>Butomus umbellatus</i> L.	I	37	96,86	R	NT	pr. B2b(iii)	43 ; 63				
<i>Buxus sempervirens</i> L.	I	242	79,49	AC	LC						
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	I	174	85,25	PC	LC		03				
<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth	I	28	97,63	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	63				
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	I	111	90,59	PC	LC		43				
<i>Calamagrostis purpurea</i> (Trin.) Trin.	I	10	99,15	RR	LC		15 ; 63	LC	X		La cotation correspond à la subsp. <i>phragmitoides</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koeler	I	3	99,75	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 43	EN	X		
<i>Calendula arvensis</i> L.	I	33	97,20	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43				La cotation correspond à la subsp. <i>arvensis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	I	58	95,08	AR	LC		03 ; 15				
<i>Callitriche brutia</i> Petagna	I	176	85,08	PC	LC						
<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall	I	5	99,58	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 63				
<i>Callitriche palustris</i> L.	I	14	98,81	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63				
<i>Callitriche platycarpa</i> Kutz.	I	20	98,31	R	DD						

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	I	212	82,03	AC	LC							
<i>Callitriche truncata</i> Guss.	I?	0	100,00	D?	RE					X		La cotation correspond à la subsp. <i>occidentalis</i> , seule sous-espèce citée en Auvergne
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	I	963	18,39	CC	LC							
<i>Caltha palustris</i> L.	I	771	34,66	CC	LC							
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	I	913	22,63	CC	LC							
<i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63			X		La cotation correspond à la subsp. <i>sylvestris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	I	4	99,66	E	CR*					X		Une partie des données se rapporte à des plantes cultivées (var. <i>sativa</i>), la cotation concerne donc uniquement la variété indigène (var. <i>pilosa</i>) qui n'a pas été revue récemment
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz var. <i>pilosa</i> DC.	I	0	100,00	D?	CR*					X		
<i>Campanula cervicaria</i> L.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iv, v) D	03 ; 63		EN	X	X	
<i>Campanula erinus</i> L.	I	0	100,00	D?	RE					X		
<i>Campanula glomerata</i> L.	I	402	65,93	C	LC							
<i>Campanula latifolia</i> L.	I	29	97,54	R	LC		43 ; 63			X	X	
<i>Campanula patula</i> L.	I	541	54,15	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>patula</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Campanula persicifolia</i> L.	I	319	72,97	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>persicifolia</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	I?	28	97,63	R	NE							
<i>Campanula rapunculus</i> L.	I	115	90,25	PC	LC		63					
<i>Campanula rhomboidalis</i> L.	I	13	98,90	RR	VU	D2	43 ; 63	Endémique ouest-alpine		X	X	
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	I	804	31,86	CC	LC							
<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	I	165	86,02	PC	LC		03					La cotation correspond à la subsp. <i>lanceolata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Campanula trachelium</i> L.	I	288	75,59	AC	LC							
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	I	1139	3,47	CC	LC							
<i>Cardamine amara</i> L.	I	216	81,69	AC	LC		03					
<i>Cardamine dentata</i> Schult.	I	5	99,58	E	DD							
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	I	654	44,58	C	LC							
<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz	I	202	82,88	AC	LC		03					
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	I	884	25,08	CC	LC							
<i>Cardamine impatiens</i> L.	I	469	60,25	C	LC							
<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz	I	25	97,88	R	NT	pr. D2				X	X	
<i>Cardamine pratensis</i> L.	I	938	20,51	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>pratensis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Cardamine raphanifolia</i> Pourr.	I?	0	100,00	D?	RE							
<i>Cardamine resedifolia</i> L.	I	18	98,47	R	NT	pr. D1	15 ; 43 ; 63					
<i>Carduus crispus</i> L.	I	120	89,83	PC	LC		15 ; 43					La cotation correspond à la subsp. <i>multiflorus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Carduus nutans</i> L.	I	626	46,95	C	LC							
<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.	I	16	98,64	RR	NT	pr. D2	15 ; 63			X	X	
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	I?	4	99,66	E	NE							
<i>Carduus vivariensis</i> Jord.	I	38	96,78	R	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>vivariensis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Carex acuta</i> L.	I	153	87,03	PC	LC							
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	I	117	90,08	PC	LC							
<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	I	38	96,78	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63					
<i>Carex atrata</i> L.	I	5	99,58	E	EN	D	15			X		La cotation correspond à la var. <i>aterima</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Carex brizoides</i> L.	I	43	96,36	AR	LC		03 ; 15				X	
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	I	638	45,93	C	LC							
<i>Carex cespitosa</i> L.	I	31	97,37	R	NT	pr. B2b(iii)	43 ; 63		LC	X	X	
<i>Carex chordonhiza</i> L.f.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63		EN	X	X	
<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	I	174	85,25	PC	LC							
<i>Carex curta</i> Gooden.	I	222	81,19	AC	LC		03					
<i>Carex curvula</i> All.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii, v)	63			X		La cotation correspond à la subsp. <i>curvula</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	I	14	98,81	RR	VU	D1	03 ; 63			X		
<i>Carex diandra</i> Schrank	I	49	95,85	AR	LC		03 ; 63					
<i>Carex digitata</i> L.	I	63	94,66	AR	LC		03 ; 43					
<i>Carex dioica</i> L.	I	3	99,75	E	EN	B2ab(iii) D	15 ; 43				X	
<i>Carex distans</i> L.	I	45	96,19	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43					
<i>Carex disticha</i> Huds.	I	256	78,31	AC	LC							
<i>Carex divisa</i> Huds.	I	8	99,32	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>divisa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Carex divulsa</i> Stokes	I	420	64,41	C	LC							
<i>Carex echinata</i> Murray	I	433	63,31	C	LC							
<i>Carex elata</i> All.	I	52	95,59	AR	LC		03					
<i>Carex elongata</i> L.	I	23	98,05	R	LC		03 ; 15 ; 63			X		
<i>Carex ericetorum</i> Pollich	I	14	98,81	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63			X		
<i>Carex flacca</i> Schreb.	I	505	57,20	C	LC							
<i>Carex halleriana</i> Asso	I	34	97,12	R	LC		03 ; 15 ; 43					La cotation correspond à la subsp. <i>halleriana</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Carex hartmanii</i> Cajander	I	2	99,83	E	EN	D	43		DD	X		
<i>Carex hirta</i> L.	I	905	23,31	CC	LC							
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	63		NT	X	X	
<i>Carex hostiana</i> DC.	I	3	99,75	E	EN	B2ab(iii)	15					
<i>Carex humilis</i> Leyss.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	03 ; 63			X		
<i>Carex laevigata</i> Sm.	I	198	83,22	AC	LC							
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	I	58	95,08	AR	LC		03 ; 43					
<i>Carex limosa</i> L.	I	49	95,85	AR	NT	pr. B2b(iii)			X	X		
<i>Carex montana</i> L.	I	6	99,49	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63			X		
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	I	418	64,58	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>nigra</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Carex ovalis</i> Gooden.	I	737	37,54	C	LC							
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	I	287	75,68	AC	LC							
<i>Carex pallescens</i> L.	I	470	60,17	C	LC							
<i>Carex panicea</i> L.	I	531	55,00	C	LC							
<i>Carex paniculata</i> L.	I	160	86,44	PC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>paniculata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	I	29	97,54	R	NT	pr. B2b(iii, v)	03 ; 15 ; 43		X	X		
<i>Carex pendula</i> Huds.	I	169	85,68	PC	LC		43					
<i>Carex pilosa</i> Scop.	I	14	98,81	RR	VU	D2	15 ; 63			X		
<i>Carex pilulifera</i> L.	I	602	48,98	C	LC							
<i>Carex praecox</i> Schreb.	I	31	97,37	R	LC		43					
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	I	56	95,25	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	43 ; 63					
<i>Carex pulicaris</i> L.	I	139	88,22	PC	LC		03					
<i>Carex remota</i> L.	I	510	56,78	C	LC							
<i>Carex riparia</i> Curtis	I	83	92,97	AR	LC		15					
<i>Carex rostrata</i> Stokes	I	399	66,19	C	LC							
<i>Carex spicata</i> Huds.	I	534	54,75	C	LC							
<i>Carex stenophylla</i> Wahlenb.	I?	3	99,75	E	NE		43					
<i>Carex strigosa</i> Huds.	I	26	97,80	R	NT	pr. D2	63			X		
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	I	513	56,53	C	LC							
<i>Carex tomentosa</i> L.	I	39	96,69	R	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 15 ; 43					
<i>Carex umbrosa</i> Host	I	80	93,22	AR	LC		03 ; 43					La cotation correspond à la var. <i>umbrosa</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Carex vaginata</i> Tausch	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	63		VU	X	X	
<i>Carex vesicaria</i> L.	I	441	62,63	C	LC							
<i>Carex viridula</i> Michx.	I	389	67,03	C	LC							
<i>Carex vulpina</i> L.	I	18	98,47	R	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63			X		
<i>Carlina acanthifolia</i> All.	I	96	91,86	PC	LC				X	X		Taxon représenté en Auvergne par deux sous-espèces, la subsp. <i>cynara</i> (menacée) et la subsp. <i>acanthifolia</i> (plus fréquente)
<i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>cynara</i> (Pourr. ex DC.) Arcang.	I	2	99,83	E	CR	D	63		X	X		
<i>Carlina biebersteinii</i> Bernh. ex Hornem.	I	4	99,66	E	EN	D	15 ; 63		VU	X	X	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	I	607	48,56	C	LC							
<i>Carpinus betulus</i> L.	I	534	54,75	C	LC							
<i>Carthamus lanatus</i> L.	I	36	96,95	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 43					
<i>Carthamus mitissimus</i> L.	I	3	99,75	E	VU	B2ab(iii) D2	03 ; 15	Endémique franco-ibérique	X	X		
<i>Carum carvi</i> L.	I	163	86,19	PC	LC							
<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch	I	488	58,64	C	LC							
<i>Castanea sativa</i> Mill.	I	639	45,85	C	LC							
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv.	I	51	95,68	AR	NT	pr. B2b(iii)						

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	I	35	97,03	R	LC		03 ; 15 ; 43					
<i>Caucalis platycarpus</i> L.	I	56	95,25	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15					
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	I	37	96,86	R	LC		03 ; 15 ; 63					
<i>Centaurea jacea</i> L.	I	1106	6,27	CC	LC							
<i>Centaurea maculosa</i> Lam.	I	123	89,58	PC	LC		15					La cotation correspond à la subsp. <i>maculosa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Centaurea pectinata</i> L.	I	46	96,10	AR	LC		03 ; 15 ; 63		X			La cotation correspond à la subsp. <i>pectinata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	I	385	67,37	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>scabiosa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	?	6	99,49	RR	NE							
<i>Centaurea stoebe</i> L.	I	1	99,92	E	DD							
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	I	418	64,58	C	LC							
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce	I	37	96,86	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>pulchellum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Duf.	I	3	99,75	E	EN	D	15 ; 43					
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	I	57	95,17	AR	NT	pr. D1	03 ; 15		X	X		
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	I	86	92,71	AR	LC		03					
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	I	46	96,10	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iv) D1	03		X	X		
<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.	I	1	99,92	E	EN	D	63					
<i>Cerastium alpinum</i> L.	I	13	98,90	RR	LC		15 ; 43 ; 63			X		
<i>Cerastium arvense</i> L.	I	308	73,90	AC	LC							
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers.	I	307	73,98	AC	LC							
<i>Cerastium diffusum</i> Pers.	?	0	100,00	D?	RE							
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	I	1112	5,76	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>vulgare</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	I	968	17,97	CC	LC							
<i>Cerastium glutinosum</i> Fr.	I	52	95,59	AR	DD							
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	I	252	78,64	AC	LC							
<i>Cerastium ramosissimum</i> Boiss.	I	10	99,15	RR	VU	D1	15 ; 43		LC	X		
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	I	150	87,29	PC	LC							
<i>Ceratocapnos claviculata</i> (L.) Lidén	I	78	93,39	AR	LC		03 ; 15					
<i>Ceratocephalus falcatus</i> (L.) Pers.	?	0	100,00	D?	RE							Indigénat à confirmer en Auvergne
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	I	62	94,75	AR	LC		15 ; 43 ; 63					
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i,ii, iii, iv)	15 ; 63		X	X		
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	I	88	92,54	PC	LC		15					
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	I	543	53,98	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>minus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Chaenorrhinum organifolium</i> (L.) Kostel.	?	1	99,92	E	NE							La cotation correspond à la subsp. <i>organifolium</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	I	435	63,14	C	LC		03					
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	I	517	56,19	C	LC							
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	I	856	27,46	CC	LC							
<i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch	I	19	98,39	R	LC		63					
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	I	68	94,24	AR	LC							
<i>Chelidonium majus</i> L.	I	871	26,19	CC	LC							
<i>Chenopodium album</i> L.	I	1050	11,02	CC	LC							
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	I	421	64,32	C	LC							
<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	?	8	99,32	RR	NE							
<i>Chenopodium glaucum</i> L.	I	149	87,37	PC	LC		15 ; 43					
<i>Chenopodium hybridum</i> L.	I	530	55,08	C	LC							
<i>Chenopodium murale</i> L.	I	53	95,51	AR	LC		15 ; 43					
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	I	794	32,71	CC	LC							
<i>Chenopodium rubrum</i> L.	I	212	82,03	AC	LC							
<i>Chenopodium strictum</i> Roth	?	26	97,80	R	NE							
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	I	48	95,93	AR	LC		03 ; 15					
<i>Chondrilla acanthophylla</i> Borkh.	I	3	99,75	E	DD							
<i>Chondrilla juncea</i> L.	I	170	85,59	PC	LC							
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	I	312	73,56	AC	LC		03					
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	I	631	46,53	C	LC							
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v) D	03					
<i>Cichorium intybus</i> L.	I	305	74,15	AC	LC							
<i>Cicuta virosa</i> L.	I	12	98,98	RR	VU	D2	15 ; 63		X	X		

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Circaea alpina</i> L.	I	43	96,36	AR	LC		03 ; 43		X X	
<i>Circaea lutetiana</i> L.	I	590	50,00	C	LC					
<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.	I	153	87,03	PC	LC		03 ; 43			Espèce hybridogène
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	I	201	82,97	AC	LC					
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	I	1118	5,25	CC	LC					
<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill	I	111	90,59	PC	LC					
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	I	747	36,69	C	LC					
<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	I	125	89,41	PC	LC					
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	I	1041	11,78	CC	LC					
<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	I	112	90,51	PC	LC					
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(iii) D	63		X	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	I	1057	10,42	CC	LC					
<i>Cistus salviifolius</i> L.	I	5	99,58	E	VU	EN (D) (-1)	15		X	
<i>Cistus umbellatus</i> L.	I	3	99,75	E	EN	B2ab(iii, iv) D	43 ; 63		X X	La cotation correspond à la subsp. <i>umbellatus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	I	0	100,00	D?	RE				X	
<i>Clematis vitalba</i> L.	I	375	68,22	C	LC					
<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze	I	222	81,19	AC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>acinos</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Clinopodium ascendens</i> (Jord.) Samp.	I	61	94,83	AR	LC		03			
<i>Clinopodium grandiflorum</i> (L.) Kuntze	I	64	94,58	AR	LC		63			
<i>Clinopodium menthifolium</i> (Host) Stace	I	104	91,19	PC	LC					
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	I	4	99,66	E	VU	D2	63			
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	I	974	17,46	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>vulgare</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	I	13	98,90	RR	VU	D1	63		X X	
<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet	I	337	71,44	AC	LC					
<i>Colchicum autumnale</i> L.	I	509	56,86	C	LC					
<i>Conium maculatum</i> L.	I	277	76,53	AC	LC					
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	I	761	35,51	CC	LC					
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63		X	
<i>Consolida regalis</i> Gray	I	75	93,64	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 15			La cotation correspond à la subsp. <i>regalis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Convallaria majalis</i> L.	I	301	74,49	AC	LC					
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	I	900	23,73	CC	LC					
<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	I	14	98,81	RR	NT	pr. D2	43 ; 63		X X	
<i>Convolvulus lineatus</i> L.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	63		X X	
<i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	I	12	98,98	RR	CR	C2a(i)	15 ; 63		X X	
<i>Comus mas</i> L.	I	15	98,73	RR	EN	D	15			
<i>Comus sanguinea</i> L.	I	830	29,66	CC	LC					
<i>Coronilla minima</i> L.	I	29	97,54	R	LC		03 ; 43			La cotation correspond à la subsp. <i>minima</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch	I	4	99,66	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 63			
<i>Corrigiola littoralis</i> L.	I	392	66,78	C	LC					
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	I	387	67,20	C	LC					
<i>Corylus avellana</i> L.	I	1128	4,41	CC	LC					
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	I	73	93,81	AR	NT	pr. B2b(iii)	15			
<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	I	53	95,51	AR	LC					
<i>Cotoneaster juranus</i> Gand.	I	1	99,92	E	DD					
<i>Cotoneaster obtusisepalus</i> Gand.	I?	1	99,92	E	DD					
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	I	31	97,37	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63		X	
<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth	I	0	100,00	D?	CR*				X	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	I	300	74,58	AC	LC					
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	I	1121	5,00	CC	LC					
<i>Crepis biennis</i> L.	I	309	73,81	AC	LC					
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	I	1030	12,71	CC	LC					
<i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) A.Kern.	I	69	94,15	AR	LC		43			
<i>Crepis foetida</i> L.	I	185	84,32	AC	LC					
<i>Crepis lampsanoides</i> (Gouan) Tausch	I	9	99,24	RR	NT	pr. D1	15	Endémique franco-ibérique		
<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch.	I	193	83,64	AC	LC					

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	I	406	65,59	C	LC		03					
<i>Crepis pulchra</i> L.	I	148	87,46	PC	LC							
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	I	635	46,19	C	LC							
<i>Crepis vesicaria</i> L.	I	436	63,05	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>taraxacifolia</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Crocus albiflorus</i> Kit.	I	143	87,88	PC	LC							
<i>Crucianella angustifolia</i> L.	I	30	97,46	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63					
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	I	1024	13,22	CC	LC							
<i>Cruciata pedemontana</i> (Bellardi) Ehrend.	I	3	99,75	E	EN	D	43			X		
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i,ii, iii, iv)	15 ; 63				X	
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03			X	X	
<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R.Br.	I	24	97,97	R	LC		15 ; 63					
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	I	318	73,05	AC	LC							
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	I	211	82,12	AC	LC		03					La cotation correspond à la subsp. <i>epithymum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Cuscuta europaea</i> L.	I	39	96,69	R	LC		03 ; 15					
<i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill	I	97	91,78	PC	LC		43					
<i>Cyanus segetum</i> Hill	I	615	47,88	C	LC							
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	I	294	75,08	AC	LC							La cotation correspond à la var. <i>dactylon</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	I	12	98,98	RR	VU	D2	43 ; 63					
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	I	93	92,12	PC	LC		15					
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	I	965	18,22	CC	LC							
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	I?	5	99,58	E	NE						X	
<i>Cyperus flavescens</i> L.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63				X	
<i>Cyperus fuscus</i> L.	I	139	88,22	PC	LC		15					
<i>Cyperus longus</i> L.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	15					
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	I	36	96,95	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	63			X	X	
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	I	0	100,00	D?	RE				VU	X	X	
<i>Cystopteris dickieana</i> R.Sim	I	13	98,90	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	I	359	69,58	AC	LC		03					La cotation correspond à la var. <i>fragilis</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach	I	36	96,95	R	LC		63					
<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al.	I	331	71,95	AC	LC		03	Endémique franco-ibérique				
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	I	1111	5,85	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>scoparius</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Dactylis glomerata</i> L.	I	1153	2,29	CC	LC							
<i>Dactylorhiza elata</i> (Poir.) Soó	I	0	100,00	D?	CR*						X	La cotation correspond à la subsp. <i>sesquipedalis</i> , seule sous-espèce citée en Auvergne
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	I	27	97,71	R	VU	D1	63				X	Taxon représenté en Auvergne par la subsp. <i>fuchsii</i> (menacée) et le subsp. <i>psychrophila</i> (méconnue et de faible valeur taxonomique)
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i>	I	27	97,71	R	VU	D1	63				X	
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	I	34	97,12	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43			X		La cotation correspond à la subsp. <i>incarnata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	I	496	57,97	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>maculata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.	I	231	80,42	AC	LC		03					
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	I	194	83,56	AC	LC		03					
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	89	92,46	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)						
<i>Damasonium alisma</i> Mill.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iv, v) D	03			X	X	
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	I	596	49,49	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>decumbens</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Daphne laureola</i> L.	I	73	93,81	AR	LC		03					La cotation correspond à la subsp. <i>laureola</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Daphne mezereum</i> L.	I	209	82,29	AC	LC		03					
<i>Daucus carota</i> L.	I	1050	11,02	CC	LC							
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	I	808	31,53	CC	LC							
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	I	995	15,68	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>flexuosa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult.	I	6	99,49	RR	EN	CR (D) (-1)	03 ; 15					
<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	03					
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	I	36	96,95	R	LC		03 ; 43					
<i>Dianthus armeria</i> L.	I	495	58,05	C	LC							
<i>Dianthus barbatus</i> L.	I	23	98,05	R	EN	D	63			X	X	Pour partie indigène en Auvergne (subsp. <i>girardinii</i>). La cotation concerne donc uniquement cette sous-espèce, apparemment de faible valeur taxonomique et non reconnue
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	I	378	67,97	C	LC							

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Dianthus deltooides</i> L.	I	321	72,80	AC	LC		03			
<i>Dianthus graniticus</i> Jord.	I	50	95,76	AR	LC			Endémique Massif central		
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.	I	12	98,98	RR	LC		15 ; 63			
<i>Dianthus hyssopifolius</i> L.	I	140	88,14	PC	LC		43			La cotation correspond à la subsp. <i>hyssopifolius</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Dianthus seguieri</i> Vill.	I	343	70,93	AC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>pseudocollinus</i> , seule sous-espèce indigène présente en Auvergne
<i>Dianthus superbus</i> L.	I	23	98,05	R	VU	D1	03 ; 15 ; 43		X X	
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	I	23	98,05	R	NT	pr. D1	63		X X	
<i>Digitalis lutea</i> L.	I	208	82,37	AC	LC					
<i>Digitalis purpurea</i> L.	I	879	25,51	CC	LC					
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	I	130	88,98	PC	LC		43			
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	I	819	30,59	CC	LC					
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	I	532	54,92	C	LC					
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub	I	7	99,41	RR	EN	D	15 ; 43 ; 63		X X	
<i>Diphasiastrum oelgaardii</i> Stoor & al.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(v)	15		VU X X	
<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub	I	3	99,75	E	EN	B2ab(iii) D	15		VU X X	
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	I?	12	98,98	RR	NE					
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	I	77	93,47	AR	LC					
<i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC.	I?	0	100,00	D?	NE					
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	I	736	37,63	C	LC					
<i>Dipsacus pilosus</i> L.	I	101	91,44	PC	LC					
<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	I?	79	93,31	AR	LC					
<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	I	351	70,25	AC	LC		03			
<i>Doronicum pardalianches</i> L.	I	334	71,69	AC	LC		03			
<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser.	I?	2	99,83	E	CR*				X	Appareusement non revu récemment
<i>Draba aizoides</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D	15		X	
<i>Draba muralis</i> L.	I	183	84,49	AC	LC					
<i>Drosera anglica</i> Huds.	I?	1	99,92	E	CR*				X X	Appareusement non revu récemment
<i>Drosera intermedia</i> Hayne	I	21	98,22	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63		X X	
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	I	171	85,51	PC	NT	pr. B2b(iii)	03		X X	
<i>Dryas octopetala</i> L.	I	3	99,75	E	EN	D	15 ; 63		X X	
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	I	251	78,73	AC	LC					
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	I	708	40,00	C	LC					
<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray	I?	0	100,00	D?	RE				VU X	
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray	I	542	54,07	C	LC					
<i>Dryopteris expansa</i> (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy	I	55	95,34	AR	LC		03			
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	I	1087	7,88	CC	LC					
<i>Dryopteris oreades</i> Fomin	I	39	96,69	R	LC		43 ; 63			
<i>Dryopteris remota</i> (A.Braun ex Döll) Druce	I	29	97,54	R	NT	pr. D1	03 ; 63		X	
<i>Dysphania botrys</i> (L.) Mosyakin & Clemants	I	41	96,53	R	LC		15 ; 43			
<i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63			
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	I	797	32,46	CC	LC					
<i>Echium vulgare</i> L.	I	931	21,10	CC	LC					La cotation correspond à la var. <i>vulgare</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v) D	03 ; 63		X X	
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	I	32	97,29	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X X	
<i>Elatine hydropiper</i> L.	I	1	99,92	E	CR*				VU X	Appareusement non revu récemment
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	I	108	90,85	PC	LC		15			
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv.	I	22	98,14	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63			
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult.	I	48	95,93	AR	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 63		X	
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	I	417	64,66	C	LC					
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	I	11	99,07	RR	VU	D2	15 ; 63		X	
<i>Eleocharis unigulmis</i> (Link) Schult.	I	18	98,47	R	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63			
<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras	I	91	92,29	PC	LC		15			
<i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski	I	54	95,42	AR	LC		03 ; 15 ; 43			La cotation correspond à la subsp. <i>intermedia</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	I	794	32,71	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>repens</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Empetrum nigrum</i> L.	I	12	98,98	RR	VU	D1	03 ; 15 ; 43 ; 63		X	Taxon représenté en Auvergne par les subsp. <i>nigrum</i> et <i>hermaphroditum</i> , toutes deux menacées
<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Böcher	I	6	99,49	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63		X X	
<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	I	2	99,83	E	EN	D	03 ; 63		X	
<i>Ephedra major</i> Host	I?	2	99,83	E	EN	D	43		X	
<i>Epikeros pyrenaicus</i> (L.) Raf.	I	252	78,64	AC	LC					
<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.) Krock.	I	29	97,54	R	LC		43 ; 63			
<i>Epilobium alsinifolium</i> Vill.	I	20	98,31	R	LC		43 ; 63			
<i>Epilobium anagallidifolium</i> Lam.	I?	6	99,49	RR	NE		15 ; 43		X	
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	I	864	26,78	CC	LC					
<i>Epilobium collinum</i> C.C.Gmel.	I	330	72,03	AC	LC		03			
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	I?	2	99,83	E	VU	D1	63		X	La cotation correspond à la subsp. <i>dodonaei</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Epilobium duriaei</i> J.Gay ex Godr.	I	41	96,53	R	LC		43			
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	I	859	27,20	CC	LC					
<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri	I	275	76,69	AC	LC					
<i>Epilobium montanum</i> L.	I	858	27,29	CC	LC					
<i>Epilobium nutans</i> F.W.Schmidt	I	12	98,98	RR	EN	D	15 ; 63			
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	I	701	40,59	C	LC					
<i>Epilobium palustre</i> L.	I	354	70,00	AC	LC		03			
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	I	441	62,63	C	LC					
<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	I	142	87,97	PC	LC					
<i>Epilobium tetragonum</i> L.	I	902	23,56	CC	LC					
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	I	4	99,66	E	CR	D	03 ; 63		X	
<i>Epipactis exilis</i> (Baumann & Baumann) Delforge	I	2	99,83	E	EN	D	63			
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	I	188	84,07	AC	LC					
<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	I?	0	100,00	D?	NE					
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	I	19	98,39	R	VU	D1	03 ; 15 ; 43 ; 63		X X	
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	I	12	98,98	RR	EN	D	03 ; 15 ; 63		X	
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	I	36	96,95	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63		X	
<i>Epipactis rhodanensis</i> Gevaudan & Robatsch	I	6	99,49	RR	EN	D	03 ; 63		X	
<i>Epipactis viridiflora</i> (Hoffm.) Krock.	I	20	98,31	R	NT	pr. D1	03 ; 15 ; 43 ; 63		X	
<i>Epipogon aphyllum</i> Sw.	I	12	98,98	RR	VU	D2	15 ; 63		X X	
<i>Equisetum arvense</i> L.	I	880	25,42	CC	LC					
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	I	472	60,00	C	LC					
<i>Equisetum hyemale</i> L.	I	122	89,66	PC	LC					
<i>Equisetum palustre</i> L.	I	236	80,00	AC	LC					
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	I	74	93,73	AR	LC		15			
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	I	73	93,81	AR	LC		03			
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	I	87	92,63	AR	LC		43			
<i>Eragrostis minor</i> Host	I	263	77,71	AC	LC					
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	I	190	83,90	AC	LC					
<i>Erica cinerea</i> L.	I	298	74,75	AC	LC		43			
<i>Erica scoparia</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			
<i>Erica tetralix</i> L.	I	69	94,15	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)				
<i>Erica vagans</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*					
<i>Erigeron acris</i> L.	I	168	85,76	PC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>acris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Erigeron alpinus</i> L.	I	6	99,49	RR	EN	D	15 ; 63		X X	
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	I	266	77,46	AC	LC					
<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth	I	7	99,41	RR	VU	B2ab(iii) D1+2	43 ; 63		X X	
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	I	17	98,56	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63			
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	I	105	91,10	PC	LC		03			
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Her.	I?	15	98,73	RR	NT	pr. D2	43		X	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	I	906	23,22	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>cutarium</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	I	894	24,24	CC	LC					

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Eryngium campestre</i> L.	I	453	61,61	C	LC					
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	I	75	93,64	AR	LC					
<i>Euonymus europaeus</i> L.	I	817	30,76	CC	LC					
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	I	820	30,51	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>cannabinum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	I	671	43,14	C	LC					
<i>Euphorbia angulata</i> Jacq.	I	11	99,07	RR	VU	D2	03 ; 15			
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	I	581	50,76	C	LC					
<i>Euphorbia deseglisei</i> Boreau ex Boiss.	?	0	100,00	D?	NE					
<i>Euphorbia dulcis</i> L.	I	734	37,80	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>incompta</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Euphorbia esula</i> L.	I	13	98,90	RR	NT	pr. D1	03 ; 63			Taxon représenté en Auvergne par la subsp. <i>esula</i> (menacée) et la subsp. <i>tommasiniana</i> , à inclure dans la subsp. <i>saratoi</i> , et correspondant certainement à des plantes naturalisées
<i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>esula</i>	I	13	98,90	RR	NT	pr. D1	03 ; 63			
<i>Euphorbia exigua</i> L.	I	126	89,32	PC	LC			15		
<i>Euphorbia falcata</i> L.	I	42	96,44	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	43			La cotation correspond à la subsp. <i>falcata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC.	I	142	87,97	PC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>verrucosa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	I	895	24,15	CC	LC					
<i>Euphorbia hyberna</i> L.	I	159	86,53	PC	LC			43		La cotation correspond à la subsp. <i>hyberna</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Euphorbia loreyi</i> Jord.	I	1	99,92	E	EN	D	03			
<i>Euphorbia peplus</i> L.	I	412	65,08	C	LC					
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	I	58	95,08	AR	LC			15		
<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck.	I	0	100,00	D?	RE					La cotation correspond à la var. <i>seguieriana</i> , seule variété citée en Auvergne
<i>Euphorbia stricta</i> L.	I	281	76,19	AC	LC			15		
<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	I	38	96,78	R	LC			03 ; 15		
<i>Euphrasia alpina</i> Lam.	?	1	99,92	E	NE					
<i>Euphrasia cebennensis</i> A.B.Martins	I	0	100,00	D?	NE				Endémique Massif central	
<i>Euphrasia hirtella</i> Jord. ex Reut.	I	9	99,24	RR	DD					
<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	I	17	98,56	RR	LC			43 ; 63		
<i>Euphrasia minima</i> Jacq. ex DC.	I	29	97,54	R	LC			43		
<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.	I	13	98,90	RR	DD					
<i>Euphrasia officinalis</i> L.	I	271	77,03	AC	LC			03		
<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	I	2	99,83	E	DD					
<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck	I	3	99,75	E	EN	D	15 ; 43 ; 63			
<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm.	I	195	83,47	AC	LC					
<i>Euphrasia tetraquetra</i> (Bréb.) Arrond.	?	0	100,00	D?	NE					
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03		X	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	I	923	21,78	CC	LC					
<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	I	115	90,25	PC	LC			15		
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	I	872	26,10	CC	LC					
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	I	491	58,39	C	LC					
<i>Festuca airoides</i> Lam.	I	15	98,73	RR	LC			15 ; 43 ; 63		
<i>Festuca alpina</i> Suter	I	0	100,00	D?	RE					
<i>Festuca altissima</i> All.	I	105	91,10	PC	LC			03 ; 43		
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	I	819	30,59	CC	LC					
<i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann.	I	402	65,93	C	LC			03		
<i>Festuca auquieri</i> Kerguélen	I	4	99,66	E	DD				Endémique française	
<i>Festuca billyi</i> Kerguélen & Plonka	I	27	97,71	R	LC			15 ; 43		
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	I	283	76,02	AC	LC					
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	I	421	64,32	C	LC					
<i>Festuca heteropachys</i> (St.-Yves) Patzke ex Auquier	I	9	99,24	RR	DD					
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	I	458	61,19	C	LC					
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	I	252	78,64	AC	LC					
<i>Festuca longifolia</i> Thuill.	I	25	97,88	R	LC			03 ; 43 ; 63		La cotation correspond à la subsp. <i>longifolia</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt.	I	2	99,83	E	DD					
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	I	373	68,39	C	LC					

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Festuca ovina</i> L.	I	45	96,19	AR	LC		63			La cotation correspond à la subsp. <i>guestfalica</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell.	I	57	95,17	AR	LC		03 ; 43			
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	I	429	63,64	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>pratensis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Festuca rivularis</i> Boiss.	I	185	84,32	AC	LC		03			
<i>Festuca rubra</i> L.	I	804	31,86	CC	LC					
<i>Festuca trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) K.Richt.	I	5	99,58	E	DD					
<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin	I	27	97,71	R	LC		43			
<i>Filago arvensis</i> L.	I	161	86,36	PC	LC					
<i>Filago gallica</i> L.	I	16	98,64	RR	NT	pr. B2b(ii, iii)	15 ; 43 ; 63			
<i>Filago lutescens</i> Jord.	I	25	97,88	R	NT	pr. B2b(ii, iii)	03 ; 15 ; 63			
<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.	I	525	55,51	C	LC					
<i>Filago pyramidata</i> L.	I	20	98,31	R	NT	pr. B2b(ii, iii)	03 ; 15 ; 43 ; 63			
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	I	418	64,58	C	LC					
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	I	995	15,68	CC	LC					
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	I	42	96,44	AR	LC		03 ; 15 ; 63			
<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet	?	0	100,00	D?	NE					
<i>Fragaria vesca</i> L.	I	1029	12,80	CC	LC					
<i>Fragaria viridis</i> Weston	I	55	95,34	AR	LC		03 ; 15			
<i>Frangula dodonei</i> Ard.	I	502	57,46	C	LC		43			
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	I	10	99,15	RR	VU	D1	03 ; 63	X X		La cotation correspond à la subsp. <i>angustifolia</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne (la subsp. <i>oxycarpa</i> serait citée par erreur)
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	I	1123	4,83	CC	LC					
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	I	10	99,15	RR	VU	D2	15	X X		La cotation correspond à la subsp. <i>meleagris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren.	I	69	94,15	AR	LC		03			
<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex Koch	I	24	97,97	R	LC		03 ; 15 ; 43 ; 63			
<i>Fumaria officinalis</i> L.	I	572	51,53	C	LC					
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	I	28	97,63	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43			Taxon représenté en Auvergne par deux sous-espèces, la subsp. <i>vaillantii</i> (menacée) et la subsp. <i>schleicheri</i> (non indigène). La cotation concerne donc uniquement la subsp. <i>vaillantii</i>
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel. subsp. <i>vaillantii</i>	I	28	97,63	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43			
<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f.	I	42	96,44	AR	LC		03 ; 15 ; 63	X X		
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	I	163	86,19	PC	LC			X X		
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	I	9	99,24	RR	EN	D	43 ; 63	X X		
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet	I	168	85,76	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)		X X		
<i>Galanthus nivalis</i> L.	I	220	81,36	AC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>nivalis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f.	I	26	97,80	R	NT	pr. B2b(iii) D2	03 ; 43			La cotation correspond à la subsp. <i>linosyris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	I	700	40,68	C	LC					
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	I	1062	10,00	CC	LC					
<i>Galium anisophyllum</i> Vill.	I	6	99,49	RR	DD					
<i>Galium aparine</i> L.	I	1123	4,83	CC	LC					
<i>Galium boreale</i> L.	I	12	98,98	RR	NT	pr. B2b(iii) D2	15 ; 43	X		
<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	I	1	99,92	E	NE					
<i>Galium glaucum</i> L.	I	23	98,05	R	NT	pr. B2b(iii) D2	03 ; 43			
<i>Galium lucidum</i> All.	I	5	99,58	E	DD					
<i>Galium mollugo</i> L.	I	1107	6,19	CC	LC					
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	I	427	63,81	C	LC					
<i>Galium palustre</i> L.	I	941	20,25	CC	LC					
<i>Galium parisiense</i> L.	I	54	95,42	AR	LC		63			Taxon représenté en Auvergne par deux sous-espèces, la subsp. <i>divaricatum</i> (menacée) et la subsp. <i>parisiense</i> (plus fréquente, mais d'intérêt départemental dans le Puy-de-Dôme)
<i>Galium parisiense</i> L. subsp. <i>divaricatum</i> (Pourr. ex Lam.) Rouy	I	6	99,49	RR	VU	D1	03 ; 15 ; 43			
<i>Galium pumilium</i> Murray	I	290	75,42	AC	LC		03			
<i>Galium rotundifolium</i> L.	I	265	77,54	AC	LC		03			
<i>Galium saxatile</i> L.	I	554	53,05	C	LC					
<i>Galium timeroyi</i> Jord.	?	1	99,92	E	NE					
<i>Galium tricoratum</i> Dandy	I	26	97,80	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	63	X		

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Galium uliginosum</i> L.	I	652	44,75	C	LC							
<i>Galium verum</i> L.	I	900	23,73	CC	LC							
<i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M.Bieb.) Thell.	I	19	98,39	R	VU	D1	43 ; 63			X		
<i>Gastrium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell.	I	5	99,58	E	DD							
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv.	I	183	84,49	AC	LC							
<i>Genista anglica</i> L.	I	313	73,47	AC	LC							
<i>Genista germanica</i> L.	I	8	99,32	RR	EN	D	43 ; 63				X	
<i>Genista pilosa</i> L.	I	719	39,07	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>pilosa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Genista sagittalis</i> L.	I	651	44,83	C	LC							
<i>Genista tinctoria</i> L.	I	428	63,73	C	LC							
<i>Gentiana cruciata</i> L.	I	22	98,14	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63			X		
<i>Gentiana lutea</i> L.	I	290	75,42	AC	LC		03					
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	I	220	81,36	AC	LC		03					
<i>Gentiana verna</i> L.	I	22	98,14	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	63			X		
<i>Gentianella campestris</i> (L.) Borner	I	104	91,19	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03					La cotation correspond à la subsp. <i>campestris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v) D	15			X	X	
<i>Geranium columbinum</i> L.	I	863	26,86	CC	LC							
<i>Geranium dissectum</i> L.	I	852	27,80	CC	LC							
<i>Geranium lucidum</i> L.	I	163	86,19	PC	LC		03					
<i>Geranium molle</i> L.	I	592	49,83	C	LC							
<i>Geranium nodosum</i> L.	I	220	81,36	AC	LC							
<i>Geranium phaeum</i> L.	I	272	76,95	AC	LC		03					
<i>Geranium pratense</i> L.	I?	6	99,49	RR	NE							
<i>Geranium pusillum</i> L.	I	567	51,95	C	LC							
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	I	891	24,49	CC	LC							
<i>Geranium robertianum</i> L.	I	1121	5,00	CC	LC							
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	I	520	55,93	C	LC							
<i>Geranium sanguineum</i> L.	I	37	96,86	R	LC		63					
<i>Geranium sylvaticum</i> L.	I	369	68,73	AC	LC		03					La cotation correspond à la subsp. <i>sylvaticum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Geum montanum</i> L.	I	10	99,15	RR	NT	pr. D2	15 ; 63			X		
<i>Geum rivale</i> L.	I	306	74,07	AC	LC		03					
<i>Geum urbanum</i> L.	I	1114	5,59	CC	LC							
<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	I	1	99,92	E	CR	D	63		CR	X		
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63			X	X	
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	I	1	99,92	E	CR	D	63		NT	X		
<i>Glechoma hederacea</i> L.	I	989	16,19	CC	LC							
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15					
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	I	549	53,47	C	LC							
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	I	803	31,95	CC	LC							
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	I	41	96,53	R	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 63			X		
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	I	193	83,64	AC	LC							
<i>Gnaphalium norvegicum</i> Gunnerus	I	10	99,15	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63			X		
<i>Gnaphalium supinum</i> L.	I	2	99,83	E	VU	D1	63			X		
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	I	433	63,31	C	LC							
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	I	796	32,54	CC	LC							
<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br.	I	307	73,98	AC	LC		03					
<i>Gratiola officinalis</i> L.	I	9	99,24	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63			X	X	
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15					
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	I	126	89,32	PC	LC		03					La cotation correspond à la subsp. <i>conopsea</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) D.Dietr.	I	0	100,00	D?	DD							
<i>Gymnadenia nigra</i> (L.) Rchb.f.	I	18	98,47	R	NT	pr. D1+2	15 ; 43 ; 63			X	X	La cotation correspond à la subsp. <i>austriaca</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	I	1	99,92	E	NE						X	
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	I	226	80,85	AC	LC		03					
<i>Gypsophila muralis</i> L.	I	358	69,66	AC	LC							
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze	I	0	100,00	D?	RE				EN	X	X	
<i>Hedera helix</i> L.	I	1016	13,90	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>helix</i> , seule sous-espèce indigène présente en Auvergne

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	I	70	94,07	AR	LC		15			La cotation correspond à la subsp. <i>apenninum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Helianthemum grandiflorum</i> (Scop.) DC.	?	13	98,90	RR	DD					
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	I	688	41,69	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>nummularium</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill.	I	9	99,24	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63		X X	
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	I	1	99,92	E	CR	D	15		X	
<i>Helictotrichon sedenense</i> (Clarion ex DC.) Holub	I	15	98,73	RR	LC		15 ; 63			La cotation correspond à la subsp. <i>sedenense</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	I	131	88,90	PC	LC		15			
<i>Helleborus foetidus</i> L.	I	517	56,19	C	LC					
<i>Helleborus viridis</i> L.	I	19	98,39	R	LC		43 ; 63		X	
<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63		X	
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch	I	139	88,22	PC	LC		15			
<i>Heracleum sibiricum</i> L.	I	161	86,36	PC	LC		63			
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	I	1102	6,61	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>sphondylium</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Hermidium monorchis</i> (L.) R.Br.	?	0	100,00	D?	NE					
<i>Herniaria glabra</i> L.	I	247	79,07	AC	LC					La cotation correspond à la var. <i>glabra</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	I	132	88,81	PC	LC					
<i>Hieracium acuminatum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	NE					
<i>Hieracium amplexicaule</i> L.	I	35	97,03	R	DD					
<i>Hieracium analogum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium anfractum</i> (Fr.) Fr.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium approximatum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium argillaceum</i> Jord.	I	259	78,05	AC	LC					
<i>Hieracium arrectarium</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium asperatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium aspermatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium aspreticola</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium asteriforme</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	I	14	98,81	RR	VU	D1	15 ; 63		X X	La cotation correspond à la subsp. <i>aurantiacum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Hieracium auratum</i> Fr.	I	6	99,49	RR	DD					
<i>Hieracium aurigeranum</i> Loret & Timb.-Lagr.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium aurulentum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium aviicola</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium bastardianum</i> Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium blyttianum</i> Fr.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium boraeum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium brevidentatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium brunelliforme</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium cantalicum</i> Arv.-Touv.	I	2	99,83	E	VU	D1	15 ; 63		X	
<i>Hieracium cebennense</i> Arv.-Touv. ex B.-A.Martin	?	0	100,00	D?	NE					
<i>Hieracium celsicaule</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium ceratodon</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium cerinthoides</i> L.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium cheriense</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium chlorophyllum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium cinerascens</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium columnare</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium comatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium commixtum</i> Jord.	I	1	99,92	E	DD					
<i>Hieracium conicum</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium consociatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium conspicuum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium cretaceum</i> Arv.-Touv. & Gaut.	I	1	99,92	E	DD					
<i>Hieracium cruentum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium cuspidatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium cymosum</i> L.	I	4	99,66	E	VU	D1+2	15		X X	La cotation correspond à la subsp. <i>cymosum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Hieracium deductum</i> Sudre	I	0	100,00	D?	DD					

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Hieracium deltophyllum</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium diaphanoides</i> Lindeb.	I	3	99,75	E	DD					
<i>Hieracium divisum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium dryadeum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium dumosum</i> Jord.	I	1	99,92	E	DD					
<i>Hieracium exotericum</i> Jord. ex Boreau	I	2	99,83	E	DD					
<i>Hieracium falcidens</i> Arv.-Touv.	I	4	99,66	E	DD				X	
<i>Hieracium fallens</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium fastigiatum</i> Fr.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium festinum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium fictum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium flagelliferum</i> Ravaud	I	1	99,92	E	DD					
<i>Hieracium flagellosum</i> Martin-Donos	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium fragile</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium gallicum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium gentile</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium glanduliferum</i> Hoppe	I	1	99,92	E	CR	D	63		X	
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	I	342	71,02	AC	LC					
<i>Hieracium grandidens</i> Dahlst.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium hirsutum</i> Bernh. ex Froel.	I	3	99,75	E	DD					
<i>Hieracium insuetum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium inuloides</i> Tausch	I	3	99,75	E	DD					
<i>Hieracium irriguum</i> (Fr.) Dahlst.	I	1	99,92	E	DD					
<i>Hieracium jaccardii</i> Zahn	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium jaceoides</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium jaubertianum</i> Timb.-Lagr. & Loret	I?	0	100,00	D?	NE					
<i>Hieracium laceratum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	I	645	45,34	C	LC					
<i>Hieracium laevicaule</i> Jord.	I	18	98,47	R	DD					
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	I	203	82,80	AC	LC					
<i>Hieracium lamyi</i> F.W.Schultz	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium lanceolatum</i> Vill.	I	1	99,92	E	DD					
<i>Hieracium latobrigorum</i> (Zahn) Roffey	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium laurinum</i> Arv.-Touv.	I	3	99,75	E	DD					
<i>Hieracium lepidulum</i> (Stenstr.) Omang	I	2	99,83	E	DD					
<i>Hieracium lividum</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium maculatum</i> Schrank	I	94	92,03	PC	LC					
<i>Hieracium murorum</i> L.	I	585	50,42	C	LC					
<i>Hieracium nemorense</i> Jord.	I	1	99,92	E	DD					
<i>Hieracium niveum</i> (Müll.Arg.) Zahn	I	56	95,25	AR	LC		03 ; 43			La cotation correspond à la subsp. <i>saussureoides</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Hieracium nobile</i> Gren. & Godr.	I?	0	100,00	D?	NE					
<i>Hieracium obliquum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium oblongum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium oegocladum</i> Jord. ex Boreau	I	1	99,92	E	DD					
<i>Hieracium onosmoides</i> Fr.	I	4	99,66	E	DD					
<i>Hieracium ovalifolium</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium pallidifolium</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium pallidum</i> Biv.	I	19	98,39	R	DD					
<i>Hieracium paucifolium</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat	I	32	97,29	R	LC				X	Taxon représenté en Auvergne par les subsp. <i>ligericum</i> et <i>peleterianum</i> , toutes deux menacées
<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat subsp. <i>ligericum</i> Zahn	I	14	98,81	RR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43 ; 63		X	X
<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat subsp. <i>peleterianum</i>	I	6	99,49	RR	VU	D1	15 ; 63		X	
<i>Hieracium percissum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium periphanooides</i> Zahn	I	3	99,75	E	DD				X	La cotation correspond à la subsp. <i>subniveum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Hieracium perpropinquum</i> (Zahn) Druce	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium petiolare</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Hieracium picturatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium pilatense</i> Jord. ex Boreau	I	2	99,83	E	DD					
<i>Hieracium piliferum</i> Hoppe	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium pilosella</i> L.	I	1045	11,44	CC	LC					
<i>Hieracium pinetorum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium platyphyllum</i> (Arv.-Touv.) Arv.-Touv.	I	5	99,58	E	DD				X	
<i>Hieracium pollichiae</i> Sch.Bip.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium praecox</i> Sch.Bip.	I	197	83,31	AC	LC					
<i>Hieracium prasinifolium</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium prenanthoides</i> Vill.	I	18	98,47	R	DD					
<i>Hieracium pseudogothicum</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium pseudojuranum</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium pullatum</i> Arv.-Touv.	I	8	99,32	RR	DD				X	
<i>Hieracium pulmonarioides</i> Vill.	I	3	99,75	E	DD				X	
<i>Hieracium quercetorum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium recensitum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium rigens</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium rigidum</i> Hartm.	I	3	99,75	E	DD					
<i>Hieracium sabaudum</i> L.	I	365	69,07	AC	LC					
<i>Hieracium sagotii</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium scabiosum</i> (Sudre) Sudre	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium scabripes</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium schmidtii</i> Tausch	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium serratifolium</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium serum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium similitum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium sonchoides</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium sparsum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium striatum</i> Tausch	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium subgracilipes</i> (Zahn) P.D.Sell & C.West	I	2	99,83	E	DD					
<i>Hieracium subhirsutum</i> Jord. ex Boreau	I	4	99,66	E	DD					
<i>Hieracium subolidum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium subperfoliatum</i> Arv.-Touv.	I?	0	100,00	D?	NE					
<i>Hieracium subrude</i> (Arv.-Touv.) Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium sudrei</i> Charb.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium taraxacifolium</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium tenuiflorum</i> Arv.-Touv. ex C.Bicknell	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium tinctum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium tortifolium</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium tridentatum</i> Fr.	I	2	99,83	E	DD					
<i>Hieracium turnitfolium</i> Arv.-Touv.	I	1	99,92	E	DD				X	
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	I	411	65,17	C	LC					
<i>Hieracium umbelliforme</i> Jord. ex Boreau	I	1	99,92	E	DD					
<i>Hieracium umbrosum</i> Jord.	I	4	99,66	E	EN	D	15 ; 63			
<i>Hieracium vagum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium vasconicum</i> Martrin-Donos	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium vernum</i> Sauzé & Maillard	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium virgultorum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Hieracium viride</i> Arv.-Touv.	I	2	99,83	E	DD				X	La cotation correspond à la subsp. <i>trachyticum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Hieracium vogesiacum</i> (Kirschl.) Moug. ex Fr.	I	9	99,24	RR	VU	D1	15 ; 63		X	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	I	240	79,66	AC	LC					
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	I	280	76,27	AC	LC					
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	I	10	99,15	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63		X	
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	I	0	100,00	D?	RE					
<i>Holandraea carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov	I	53	95,51	AR	LC		15			
<i>Holcus lanatus</i> L.	I	1127	4,49	CC	LC					

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Holcus mollis</i> L.	I	1054	10,68	CC	LC							
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	I	239	79,75	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>umbellatum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Hordeilymus europaeus</i> (L.) Harz	I	74	93,73	AR	LC		43					
<i>Hordeum murinum</i> L.	I	741	37,20	C	LC							
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63					
<i>Homungia petraea</i> (L.) Rchb.	I	6	99,49	RR	VU	D1	15 ; 63					
<i>Hottonia palustris</i> L.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03			X		
<i>Humulus lupulus</i> L.	I	511	56,69	C	LC							
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	I	34	97,12	R	LC		03 ; 43			X		
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	I	70	94,07	AR	LC					X		
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	I	8	99,32	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63					
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	I	104	91,19	PC	LC							
<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub	I	389	67,03	C	LC							
<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H. Ohba	I	743	37,03	C	LC							
<i>Hymenolobus procumbens</i> (L.) Nutt. ex Schinz & Thell.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	63			X		
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	I	30	97,46	R	NT	pr. D2	03 ; 15 ; 63					
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	I	47	96,02	AR	LC		03 ; 43 ; 63			X		
<i>Hypericum desetangii</i> Lamotte	I?	4	99,66	E	EN	D	03 ; 63		X	X		Espèce hybridogène
<i>Hypericum elodes</i> L.	I	63	94,66	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)						
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	I	170	85,59	PC	LC							
<i>Hypericum humifusum</i> L.	I	633	46,36	C	LC							
<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl	I	44	96,27	AR	LC		03 ; 63					
<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	I	278	76,44	AC	LC		03					
<i>Hypericum montanum</i> L.	I	139	88,22	PC	LC		03					
<i>Hypericum perforatum</i> L.	I	1139	3,47	CC	LC							
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	I	539	54,32	C	LC							
<i>Hypericum richeri</i> Vill.	I	2	99,83	E	EN	D	43		X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>richeri</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	I	582	50,68	C	LC							
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	I	127	89,24	PC	LC							
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	I	119	89,92	PC	LC		03					
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	I	1146	2,88	CC	LC							
<i>Iberis amara</i> L.	I	14	98,81	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 63					
<i>Ilex aquifolium</i> L.	I	814	31,02	CC	LC							
<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	I	32	97,29	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43					
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	I	432	63,39	C	LC							
<i>Imperatoria ostruthium</i> L.	I	43	96,36	AR	LC							
<i>Inula bifrons</i> (L.) L.	I	31	97,37	R	LC		03		X	X		
<i>Inula britannica</i> L.	I	8	99,32	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X		
<i>Inula conyzia</i> DC.	I	440	62,71	C	LC							
<i>Inula montana</i> L.	I	30	97,46	R	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 43			X		
<i>Inula salicina</i> L.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63		X			La cotation correspond à la subsp. <i>salicina</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Inula spiraeifolia</i> L.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	63			X		
<i>Iris foetidissima</i> L.	I	69	94,15	AR	LC							
<i>Iris pseudacorus</i> L.	I	688	41,69	C	LC							
<i>Isatis tinctoria</i> L.	I?	14	98,81	RR	NE							
<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	63		VU	X	X	
<i>Isoetes lacustris</i> L.	I	8	99,32	RR	VU	B2ab(iii) D2	43 ; 63		LC	X	X	
<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63				X	
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br.	I	343	70,93	AC	LC							
<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	I	242	79,49	AC	LC							
<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat	I	518	56,10	C	LC			Endémique franco-ibérique				
<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	9	99,24	RR	VU	D2	03 ; 43					
<i>Jacobaea erratica</i> (Bertol.) Fourr.	I	30	97,46	R	LC		43 ; 63					
<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	128	89,15	PC	LC		15					
<i>Jacobaea leucophylla</i> (DC.) Pelsier	I	1	99,92	E	EN	D	43		LC	X	X	

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.	I	1012	14,24	CC	LC							
<i>Jasione crispa</i> (Pourr.) Samp.	I	1	99,92	E	EN	B2ab(iii)	63	Endémique Massif central	EN	X	X	La cotation correspond à la subsp. <i>arvernensis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Jasione laevis</i> Lam.	I	348	70,51	AC	LC		03					
<i>Jasione montana</i> L.	I	861	27,03	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>montana</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	I	865	26,69	CC	LC							
<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix	I	32	97,29	R	LC		43					
<i>Juncus anceps</i> Laharpe	?	0	100,00	D?	NE							
<i>Juncus articulatus</i> L.	I	616	47,80	C	LC							La cotation correspond à la var. <i>articulatus</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Juncus bufonius</i> L.	I	747	36,69	C	LC							
<i>Juncus bulbosus</i> L.	I	370	68,64	AC	LC							
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	I	22	98,14	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63					
<i>Juncus compressus</i> Jacq.	I	60	94,92	AR	LC		15					
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	I	807	31,61	CC	LC							
<i>Juncus effusus</i> L.	I	1108	6,10	CC	LC							
<i>Juncus filiformis</i> L.	I	76	93,56	AR	LC							
<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	I	13	98,90	RR	VU	D2	43 ; 63		X	X		
<i>Juncus inflexus</i> L.	I	514	56,44	C	LC							
<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill.	I	3	99,75	E	DD							
<i>Juncus ranarius</i> Songeon & Perrier	I	0	100,00	D?	DD							
<i>Juncus squarrosus</i> L.	I	245	79,24	AC	LC		03					
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	63					
<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f.	I	39	96,69	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63					
<i>Juniperus communis</i> L.	I	741	37,20	C	LC							
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	I	268	77,29	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>elatine</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	I	156	86,78	PC	LC		15					La cotation correspond à la subsp. <i>spuria</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	I	761	35,51	CC	LC							
<i>Knautia arvernensis</i> (Briq.) Szabó	I	617	47,71	C	LC		03					
<i>Knautia basaltica</i> Chass. & Szabó	I	36	96,95	R	LC		15	Endémique Massif central				
<i>Knautia dipsacifolia</i> (Host) Kreutzer	?	240	79,66	AC	NE							Les données de ce taxon, apparemment absent dans le Massif central doivent se rapporter à <i>K. basaltica</i> (au sens large)
<i>Knautia foreziensis</i> Chass. ex Szabó	I	77	93,47	AR	LC		15	Endémique Massif central				
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	I	172	85,42	PC	LC							
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.	I	291	75,34	AC	LC							
<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	I	50	95,76	AR	LC		15					La cotation correspond à la subsp. <i>vallesiana</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Lactuca alpina</i> (L.) Benth. & Hook.f.	I	35	97,03	R	LC							
<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn.	I	750	36,44	CC	LC							
<i>Lactuca perennis</i> L.	I	50	95,76	AR	LC		03 ; 15					
<i>Lactuca plumieri</i> (L.) Gren. & Godr.	I	149	87,37	PC	LC		03					
<i>Lactuca saligna</i> L.	I	8	99,32	RR	EN	D	15 ; 43 ; 63					
<i>Lactuca serriola</i> L.	I	915	22,46	CC	LC							
<i>Lactuca viminea</i> (L.) J. & C.Presl	I	151	87,20	PC	LC		03					La cotation correspond à la subsp. <i>chondrilliflora</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Lactuca virosa</i> L.	I	438	62,88	C	LC							
<i>Lamium album</i> L.	I	871	26,19	CC	LC							
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	I	495	58,05	C	LC							
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	I	890	24,58	CC	LC							
<i>Lamium hybridum</i> Vill.	I	218	81,53	AC	LC							
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	I	426	63,90	C	LC							
<i>Lamium purpureum</i> L.	I	890	24,58	CC	LC							
<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	15 ; 43 ; 63					
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	I	8	99,32	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 43 ; 63					
<i>Lapsana communis</i> L.	I	1131	4,15	CC	LC							
<i>Laserpitium latifolium</i> L.	I	259	78,05	AC	LC		03					La cotation correspond à la var. <i>latifolium</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Lathraea clandestina</i> L.	I	153	87,03	PC	LC							

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Lathraea squamaria</i> L.	I	39	96,69	R	LC		03 ; 43				X	
<i>Lathyrus angulatus</i> L.	I	16	98,64	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63					
<i>Lathyrus annuus</i> L.	I?	0	100,00	D?	RE							
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	I	149	87,37	PC	LC							
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	I	172	85,42	PC	LC							
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	I	253	78,56	AC	LC							
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	I	688	41,69	C	LC							
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	I	92	92,20	PC	LC		03					La cotation correspond à la subsp. <i>niger</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	I	119	89,92	PC	LC							
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	I	1061	10,08	CC	LC							
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	I	69	94,15	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03					
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	I	142	87,97	PC	LC		03					La cotation correspond à la subsp. <i>sylvestris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	I	152	87,12	PC	LC							
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	I	15	98,73	RR	VU	D2	15				X	
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	I	211	82,12	AC	LC							
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63				X	
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	I	209	82,29	AC	LC							
<i>Lemna gibba</i> L.	I	33	97,20	R	LC		43 ; 63					
<i>Lemna minor</i> L.	I	654	44,58	C	LC							
<i>Lemna trisulca</i> L.	I	18	98,47	R	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Leontodon crispus</i> Vill.	I	1	99,92	E	CR	D	15					
<i>Leontodon hispidus</i> L.	I	778	34,07	CC	LC							
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	I	164	86,10	PC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>saxatilis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	I?	10	99,15	RR	VU	D2	43 ; 63				X	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	I	577	51,10	C	LC							
<i>Lepidium graminifolium</i> L.	I	91	92,29	PC	LC		03 ; 15					La cotation correspond à la subsp. <i>graminifolium</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.	I	173	85,34	PC	LC		15					
<i>Lepidium latifolium</i> L.	I	2	99,83	E	VU	D2	63				X	
<i>Lepidium ruderale</i> L.	I	51	95,68	AR	LC		03					
<i>Lepidium squamatum</i> Forssk.	I	34	97,12	R	LC		15 ; 43 ; 63					
<i>Leucanthemum delarbraei</i> Timb.-Lagr. ex Lamotte	I	21	98,22	R	NE							
<i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) H.J.Coste	I	26	97,80	R	LC		15	Endémique franco-ibérique	X	X		
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	I	1087	7,88	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>vulgare</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Leucocjum vernum</i> L.	I	3	99,75	E	EN	D	43				X	
<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz	I	59	95,00	AR	LC		03 ; 43					
<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	I	18	98,47	R	NT	pr. B2b(iii) D2	15 ; 43			LC	X	X
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	I	507	57,03	C	LC							
<i>Lilium martagon</i> L.	I	248	78,98	AC	LC		03				X	X
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	I	7	99,41	RR	CR	D	15 ; 43					X
<i>Limosella aquatica</i> L.	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63					X
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	I	27	97,71	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63					X
<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill.	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	I	1078	8,64	CC	LC							
<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz.	I	28	97,63	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>supina</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	I	592	49,83	C	LC							
<i>Lindernia palustris</i> Hartmann	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 63		VU	X	X	
<i>Linum austriacum</i> L.	I	11	99,07	RR	VU	D2	03 ; 63			X	X	La cotation correspond à la subsp. <i>collinum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Linum catharticum</i> L.	I	343	70,93	AC	LC							
<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz	I?	0	100,00	D?	CR*							Indigénat à confirmer en Auvergne
<i>Linum strictum</i> L.	I	0	100,00	D?	RE							La cotation correspond à la subsp. <i>strictum</i> , seule sous-espèce citée en Auvergne
<i>Linum tenuifolium</i> L.	I	34	97,12	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43					
<i>Linum trigynum</i> L.	I	6	99,49	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43					X

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Linum usitatissimum</i> L.	I	125	89,41	PC	LC							Pour partie indigène en Auvergne (subsp. <i>angustifolium</i>). La cotation concerne donc uniquement cette sous-espèce
<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br.	I	30	97,46	R	NT	pr. B2b(iii)	43			X	X	
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	I	279	76,36	AC	LC							
<i>Lithospermum officinale</i> L.	I	82	93,05	AR	LC		15 ; 43					
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	I	53	95,51	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	15 ; 43			X	X	
<i>Lobelia urens</i> L.	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03				X	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	?	554	53,05	C	LC							
<i>Lolium perenne</i> L.	I	1114	5,59	CC	LC							
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	I	49	95,85	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15					La cotation correspond à la subsp. <i>rigidum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Lolium temulentum</i> L.	I	3	99,75	E	CR*					EN	X	Quelques mentions anciennes se rapportent à la subsp. <i>linicolum</i> (= <i>L. remotum</i>), certainement accidentelle en Auvergne, la cotation concerne donc uniquement la sous-espèce indigène (subsp. <i>temulentum</i>) qui ne semble pas avoir été revue récemment
<i>Lolium temulentum</i> L. subsp. <i>temulentum</i>	I	3	99,75	E	CR*					EN	X	Apparemment non revu récemment
<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda	I	96	91,86	PC	LC		15					
<i>Lonicera alpigena</i> L.	I	22	98,14	R	VU	D1	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Lonicera caerulea</i> L.	?	0	100,00	D?	NE							
<i>Lonicera etrusca</i> Santi	I	101	91,44	PC	LC		15					
<i>Lonicera nigra</i> L.	I	217	81,61	AC	LC		03					
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	I	988	16,27	CC	LC							
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	I	568	51,86	C	LC							
<i>Lotus alpinus</i> (DC.) Schleich. ex Ramond	?	1	99,92	E	NE							
<i>Lotus angustissimus</i> L.	I	94	92,03	PC	LC		43					La cotation correspond à la subsp. <i>angustissimus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Lotus corniculatus</i> L.	I	1134	3,90	CC	LC							Taxon représenté en Auvergne par sa subsp. <i>corniculatus</i> (fréquente) et sa subsp. <i>tenuis</i> (menacée)
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.)	I	33	97,20	R	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 43 ; 63					
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	I	985	16,53	CC	LC							
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	I	69	94,15	AR	LC		15 ; 63					
<i>Lunaria rediviva</i> L.	I	153	87,03	PC	LC		03 ; 43					
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	?	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X	X	La cotation correspond à la subsp. <i>reticulatus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	I	45	96,19	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 43			NT	X	X
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	I	968	17,97	CC	LC							
<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej.	I	62	94,75	AR	LC		03					
<i>Luzula desvauxii</i> Kunth	I	21	98,22	R	LC		63					
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	I	477	59,58	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>forsteri</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Luzula luzulina</i> (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.	I	13	98,90	RR	NT	pr. D2	15 ; 43 ; 63			X	X	
<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	?	1	99,92	E	NE						X	La cotation correspond à la var. <i>luzuloides</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	I	578	51,02	C	LC							
<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	I	279	76,36	AC	LC							
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	I	577	51,10	C	LC							
<i>Luzula spicata</i> (L.) DC.	I	30	97,46	R	LC		43 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>spicata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schult.	I	21	98,22	R	NT	pr. D1	15 ; 43 ; 63					
<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	I	522	55,76	C	LC							
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	I	17	98,56	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63			NT	X	X
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	I	10	99,15	RR	VU	D1+2	15 ; 43 ; 63			X	X	
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	I	57	95,17	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03				X	
<i>Lycopsis arvensis</i> L.	I	798	32,37	CC	LC							
<i>Lycopus europaeus</i> L.	I	763	35,34	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>europaeus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb.	I	798	32,37	CC	LC							
<i>Lysimachia linum-stellatum</i> L.	?	0	100,00	D?	RE							
<i>Lysimachia maritima</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano	I	9	99,24	RR	VU	D2	63			X	X	
<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb.	I	15	98,73	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63					
<i>Lysimachia nemorum</i> L.	I	525	55,51	C	LC							
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	I	271	77,03	AC	LC		43					
<i>Lysimachia tenella</i> L.	I	124	89,49	PC	LC		43					
<i>Lysimachia thyrsoflora</i> L.	I	10	99,15	RR	VU	D2	15 ; 43			NT	X	X
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	I	811	31,27	CC	LC							

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	I	70	94,07	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63					
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb	I	396	66,44	C	LC							
<i>Lythrum salicaria</i> L.	I	612	48,14	C	LC							
<i>Lythrum thymifolium</i> L.	I	4	99,66	E	GR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63		NT	X	X	
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt	I	214	81,86	AC	LC		03					
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	I	558	52,71	C	LC							
<i>Malva alcea</i> L.	I	150	87,29	PC	LC		15					
<i>Malva moschata</i> L.	I	993	15,85	CC	LC							
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	I	884	25,08	CC	LC							
<i>Malva sylvestris</i> L.	I	576	51,19	C	LC							
<i>Marrubium vulgare</i> L.	I	53	95,51	AR	LC		15					
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	I	8	99,32	RR	GR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 63		NT	X	X	
<i>Matricaria recutita</i> L.	I	229	80,59	AC	LC							
<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	I	63	94,66	AR	LC		03			X	X	
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	I	454	61,53	C	LC							
<i>Medicago lupulina</i> L.	I	949	19,58	CC	LC							
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	I	134	88,64	PC	LC							La cotation correspond à la var. <i>minima</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv.	I	28	97,63	R	NT	pr. D1	03 ; 43			X	X	
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	I	31	97,37	R	NT	pr. D2	03 ; 15					
<i>Medicago polymorpha</i> L.	I	78	93,39	AR	LC		15					
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	I	56	95,25	AR	LC		03 ; 15					
<i>Medicago sativa</i> L.	I	576	51,19	C	LC							Pour partie indigène en Auvergne (subsp. <i>falcata</i>). La cotation concerne donc uniquement cette sous-espèce
<i>Melampyrum arvense</i> L.	I	106	91,02	PC	LC		15 ; 43					
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	I	58	95,08	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 43					
<i>Melampyrum pratense</i> L.	I	727	38,39	C	LC							
<i>Melampyrum sylvaticum</i> L.	I	40	96,61	R	DD							
<i>Melampyrum vaudense</i> (Ronniger) Soó	I	12	98,98	RR	VU	D2						X
<i>Melica ciliata</i> L.	I	144	87,80	PC	LC		03					
<i>Melica nutans</i> L.	I	34	97,12	R	LC		43 ; 63					X
<i>Melica uniflora</i> Retz.	I	554	53,05	C	LC							
<i>Melilotus albus</i> Medik.	I	597	49,41	C	LC							
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	I	91	92,29	PC	LC		15 ; 43					
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	I	255	78,39	AC	LC							
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	I	166	85,93	PC	LC							
<i>Mentha aquatica</i> L.	I	377	68,05	C	LC							
<i>Mentha arvensis</i> L.	I	710	39,83	C	LC							
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	I	346	70,68	AC	LC		03					
<i>Mentha pulegium</i> L.	I	204	82,71	AC	LC							
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	I	607	48,56	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>suaveolens</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	I	299	74,66	AC	LC							
<i>Mercurialis annua</i> L.	I	635	46,19	C	LC							
<i>Mercurialis perennis</i> L.	I	439	62,80	C	LC							
<i>Mespilus germanica</i> L.	I	151	87,20	PC	LC							
<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	I	286	75,76	AC	LC		03					
<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.	I	32	97,29	R	NT	pr. B2b(iii)	43 ; 63					X
<i>Microcyrum tenellum</i> (L.) Link	I	370	68,64	AC	LC							
<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey.	I	164	86,10	PC	LC		15					
<i>Milium effusum</i> L.	I	303	74,32	AC	LC							
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	I	75	93,64	AR	LC		15					Taxon représenté en Auvergne par les subsp. <i>hybrida</i> (menacée), <i>laxa</i> (méconnue) et <i>tenuifolia</i> (plus fréquente)
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>hybrida</i>	I	3	99,75	E	VU	D2	43 ; 63					
<i>Minuartia recurva</i> (All.) Schinz & Thell.	I	1	99,92	E	GR	B2ab(i, ii, iv)	15					La cotation correspond à la subsp. <i>condensata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb.	I	3	99,75	E	EN	D	63					X
<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern	I	8	99,32	RR	NT	pr. B2b(i, ii) D2	15 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>verna</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz & Thell.	I	5	99,58	E	EN	D	43 ; 63					DD

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	I	265	77,54	AC	LC					
<i>Moehringia muscosa</i> L.	I	13	98,90	RR	VU	D2			X	
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	I	979	17,03	CC	LC					
<i>Moenchia erecta</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	I	64	94,58	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			La cotation correspond à la var. <i>erecta</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	I	633	46,36	C	LC					
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	I	15	98,73	RR	VU	D1+2	15 ; 63		X	
<i>Monotropa hypopitys</i> L.	I	110	90,68	PC	LC		03			
<i>Montia fontana</i> L.	I	431	63,47	C	LC					
<i>Murbeckiella pinnatifida</i> (Lam.) Rothm.	I	26	97,80	R	LC		63			
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	I	526	55,42	C	LC					
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	I	157	86,69	PC	LC		15			
<i>Mutellina adonidifolia</i> (J. Gay) Gutermann	I	12	98,98	RR	LC		15 ; 63			La cotation correspond à la var. <i>mutellina</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	I?	9	99,24	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X	Indigénat à confirmer en Auvergne
<i>Myosotis alpestris</i> F.W. Schmidt	I	23	98,05	R	LC		43 ; 63			
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	I	869	26,36	CC	LC					
<i>Myosotis balbisiana</i> Jord.	I	95	91,95	PC	LC		03		X	
<i>Myosotis decumbens</i> Host	I	22	98,14	R	LC		43 ; 63			
<i>Myosotis discolor</i> Pers.	I	578	51,02	C	LC					
<i>Myosotis lamottiana</i> (Braun-Blanq.) Grau	I	162	86,27	PC	LC		03			
<i>Myosotis laxa</i> Lehm.	I	192	83,73	AC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>cespitosa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	I	399	66,19	C	LC		03			
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	I	567	51,95	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>ramosissima</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	I	581	50,76	C	LC					
<i>Myosotis secunda</i> A. Murray	I	1	99,92	E	DD					
<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult.	I	300	74,58	AC	LC					
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	I	262	77,80	AC	LC					
<i>Myosurus minimus</i> L.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63		X	
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	I	26	97,80	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63			
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	I	114	90,34	PC	LC		15			
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63			
<i>Najas marina</i> L.	I	19	98,39	R	NT	pr. D2	63		X	
<i>Najas minor</i> All.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03		X	
<i>Narcissus poeticus</i> L.	I	323	72,63	AC	LC		03			
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	I	377	68,05	C	LC					
<i>Nardus stricta</i> L.	I	494	58,14	C	LC					
<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds.	I	30	97,46	R	LC		63			
<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb.	I?	4	99,66	E	NE					
<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	I	199	83,14	AC	LC					
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	163	86,19	PC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>ustulata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	I	259	78,05	AC	LC					
<i>Neslia apiculata</i> Fisch., C.A. Mey. & Avé-Lall.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	43 ; 63		X	
<i>Nigella arvensis</i> L.	I?	0	100,00	D?	RE				CR	
<i>Noccaea brachypetala</i> (Jord.) F.K. Mey.	I	92	92,20	PC	LC					
<i>Noccaea caerulea</i> (J. Presl & C. Presl) F.K. Mey.	I	121	89,75	PC	LC		03			
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	I	34	97,12	R	LC		15 ; 63			
<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	63		X	
<i>Nymphaea alba</i> L.	I	34	97,12	R	LC		03 ; 15			
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) Kuntze	I	0	100,00	D?	RE					
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	I	1	99,92	E	VU	D2	15			La cotation correspond à la subsp. <i>luteus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.	I	327	72,29	AC	LC					
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	I	52	95,59	AR	NT	pr. B2b(iii)	43 ; 63			
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	I	16	98,64	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 43 ; 63			
<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C. Gmel.	I	0	100,00	D?	RE					
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	I	259	78,05	AC	LC		03			
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	I	5	99,58	E	VU	D2	15 ; 63			

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit. ex Willd.) DC.	I	22	98,14	R	VU	D2	15 ; 43				X	
<i>Onobrychis supina</i> (Chaix) DC.	I	21	98,22	R	NT	pr. D2					X	
<i>Ononis natrix</i> L.	I	4	99,66	E	VU	D2	15 ; 43					La cotation correspond à la subsp. <i>natrix</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Ononis pusilla</i> L.	I	14	98,81	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63			X	X	
<i>Ononis spinosa</i> L.	I	733	37,88	C	LC							
<i>Opopordum acanthium</i> L.	I	323	72,63	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>acanthium</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	I	59	95,00	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03					
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	I	105	91,10	PC	LC		15					
<i>Ophrys aranifera</i> Huds.	I	45	96,19	AR	LC		03 ; 15 ; 43			X	X	
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench	I	35	97,03	R	NT	pr. D1	03 ; 15 ; 43					La cotation correspond à la subsp. <i>fuciflora</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Ophrys insectifera</i> L.	I	41	96,53	R	NT	pr. D1	03 ; 15			X	X	
<i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus	I	24	97,97	R	NT	pr. D1	03 ; 15 ; 43			X	X	
<i>Ophrys lutea</i> Cav.	I	1	99,92	E	CR	D	15				X	La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Ophrys scolopax</i> Cav.	I	44	96,27	AR	NT	pr. D1	03 ; 15 ; 43			X	X	
<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch.	I	12	98,98	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63			X	X	
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	I	71	93,98	AR	LC		15 ; 43					
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	I	559	52,63	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>mascula</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Orchis militaris</i> L.	I	30	97,46	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 15 ; 43 ; 63			X	X	
<i>Orchis pallens</i> L.	I	2	99,83	E	VU	D1	15			X	X	
<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC.	I	2	99,83	E	CR	D	43			X	X	
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	I	110	90,68	PC	LC		15					
<i>Orchis simia</i> Lam.	I	8	99,32	RR	CR	D	15 ; 63			X	X	
<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub	I	81	93,14	AR	LC		03 ; 43 ; 63					
<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre	I	117	90,08	PC	LC							
<i>Origanum vulgare</i> L.	I	399	66,19	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>vulgare</i> , seule sous-espèce indigène présente en Auvergne
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	I	7	99,41	RR	VU	D2	15 ; 43					
<i>Ornithogalum angustifolium</i> Boreau	I	1	99,92	E	DD							
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	I	72	93,90	AR	LC							
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	I	741	37,20	C	LC							
<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.	I	41	96,53	R	LC		03					
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill.	I	50	95,76	AR	LC		03 ; 15					La cotation correspond à la subsp. <i>amethystea</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Orobanche artemisii-campestris</i> Vaucher ex Gaudin	I	2	99,83	E	EN	D	43 ; 63			DD	X	
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	I	15	98,73	RR	VU	D2	15 ; 63					
<i>Orobanche flava</i> Mart. ex F.W.Schultz	I	5	99,58	E	EN	D	15 ; 63			DD	X	
<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43					
<i>Orobanche hederæ</i> Duby	I	17	98,56	RR	VU	D1	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Orobanche major</i> L.	I?	0	100,00	D?	NE							
<i>Orobanche minor</i> Sm.	I	64	94,58	AR	LC		15 ; 43					La cotation correspond à la var. <i>minor</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Orobanche montserratii</i> A.Pujadas & D.Gómez	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz	I?	0	100,00	D?	NE						X	
<i>Orobanche rapum-genistæ</i> Thuill.	I	361	69,41	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>rapum-genistæ</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	15 ; 63					
<i>Orobanche rubens</i> Wallr.	I?	0	100,00	D?	NE							
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	I	13	98,90	RR	VU	D1+2	03 ; 15 ; 43 ; 63				X	
<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	I	77	93,47	AR	LC							
<i>Osmunda regalis</i> L.	I	25	97,88	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)					X	
<i>Oxalis acetosella</i> L.	I	753	36,19	CC	LC							
<i>Papaver argemone</i> L.	I	246	79,15	AC	LC							
<i>Papaver dubium</i> L.	I	630	46,61	C	LC							
<i>Papaver hybridum</i> L.	I	5	99,58	E	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 43 ; 63					
<i>Papaver rhoeas</i> L.	I	634	46,27	C	LC							
<i>Paradisea liliastrum</i> (L.) Bertol.	I	2	99,83	E	VU	D2	15 ; 43			X	X	
<i>Paragymnopteris marantæ</i> (L.) K.H.Shing	I	3	99,75	E	EN	D	15 ; 43			X	X	

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Parietaria judaica</i> L.	I	26	97,80	R	LC		03 ; 15 ; 43 ; 63			
<i>Parietaria officinalis</i> L.	I	18	98,47	R	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63			
<i>Paris quadrifolia</i> L.	I	361	69,41	AC	LC					
<i>Parnassia palustris</i> L.	I	216	81,69	AC	LC		03			
<i>Paronychia polygonifolia</i> (Vill.) DC.	I	3	99,75	E	EN	D	15 ; 43		X	
<i>Pastinaca sativa</i> L.	I	215	81,78	AC	LC					
<i>Pedicularis comosa</i> L.	I	15	98,73	RR	LC		43 ; 63		X	
<i>Pedicularis foliosa</i> L.	I	18	98,47	R	LC		15 ; 63		X	
<i>Pedicularis palustris</i> L.	I	89	92,46	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03			
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	I	287	75,68	AC	LC					
<i>Pedicularis verticillata</i> L.	I	4	99,66	E	VU	D1	15		X	X
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray	I	386	67,29	C	LC					
<i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp.	I	632	46,44	C	LC					
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	I	978	17,12	CC	LC					
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	I	726	38,47	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>lapathifolia</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Persicaria maculosa</i> Gray	I	911	22,80	CC	LC					
<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz	I	55	95,34	AR	LC		15 ; 43			
<i>Persicaria militis</i> (Schränk) Assenov	I	61	94,83	AR	LC		15			
<i>Persicaria vivipara</i> (L.) Ronse Decr.	I	3	99,75	E	EN	D	63		X	
<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.	I	198	83,22	AC	LC		03			
<i>Petasites hybridus</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	I	94	92,03	PC	LC		03			
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	I	468	60,34	C	LC					
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	I?	3	99,75	E	NE					La cotation correspond à la subsp. <i>saxifraga</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	I	142	87,97	PC	LC		15 ; 43	Endémique franco-ibérique		
<i>Peucedanum officinale</i> L.	I?	1	99,92	E	EN	D	15		X	La cotation correspond à la var. <i>officinale</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	I	782	33,73	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>arundinacea</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	I	134	88,64	PC	LC		03			
<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel	I	2	99,83	E	NE				X	X
<i>Phelipanche inexpectata</i> Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., O. Sánchez & Schneew.	I	2	99,83	E	EN	D	63			
<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják	I	10	99,15	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63			
<i>Phelipanche ramosa</i> (L.) Pomel	I	1	99,92	E	EN	D	43			
<i>Phleum alpinum</i> L.	I	13	98,90	RR	LC		63		X	La cotation correspond à la subsp. <i>alpinum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Phleum arenarium</i> L.	I?	0	100,00	D?	RE					
<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	I	8	99,32	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63		X	
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst.	I	256	78,31	AC	LC					
<i>Phleum pratense</i> L.	I	916	22,37	CC	LC					
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	I	268	77,29	AC	LC					
<i>Physalis alkekengi</i> L.	I	49	95,85	AR	LC		43			
<i>Phyteuma gallicum</i> R. Schulz	I	25	97,88	R	LC		43 ; 63	Endémique Massif central		
<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.	I	23	98,05	R	LC		43 ; 63			
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	I	96	91,86	PC	LC		03			
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	I	597	49,41	C	LC					
<i>Picris hieracioides</i> L.	I	541	54,15	C	LC					
<i>Pilularia globulifera</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63		X	X
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	I	352	70,17	AC	LC					
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	I	859	27,20	CC	LC					
<i>Pinguicula grandiflora</i> Lam.	I	9	99,24	RR	VU	D1+2	43 ; 63		X	X
<i>Pinguicula lusitanica</i> L.	I	1	99,92	E	CR*				X	X
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	I	60	94,92	AR	LC		43			Apparemment non revu récemment
<i>Pinus mugo</i> Turra	I?	25	97,88	R	NE					La cotation correspond à la subsp. <i>uncinata</i> dont l'indigénat serait à confirmer en Auvergne
<i>Pinus sylvestris</i> L.	I	918	22,20	CC	LC					

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Pisum sativum</i> L.	I	60	94,92	AR	CR*					Presque toutes les mentions se rapportent à des individus cultivés (subsp. <i>sativum</i>), la cotation concerne donc uniquement la sous-espèce indigène (subsp. <i>biflorum</i>) qui n'a pas été revue récemment
<i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>biflorum</i> (Raf.) Soldano	I	0	100,00	D?	CR*					
<i>Plantago alpina</i> L.	I	11	99,07	RR	LC		15 ; 63			
<i>Plantago coronopus</i> L.	I	519	56,02	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>coronopus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Plantago holosteum</i> Scop.	I	18	98,47	R	NT	pr. D2	63		X	La cotation correspond à la var. <i>holosteum</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Plantago lanceolata</i> L.	I	1153	2,29	CC	LC					
<i>Plantago major</i> L.	I	1134	3,90	CC	LC					
<i>Plantago maritima</i> L.	I	9	99,24	RR	VU	D2	15 ; 63		X X	Taxon représenté en Auvergne par les subsp. <i>maritima</i> et subsp. <i>serpentina</i> , toutes deux menacées
<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	I	3	99,75	E	VU	D2	63		X X	
<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcang.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	15		X X	
<i>Plantago media</i> L.	I	165	86,02	PC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>media</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Plantago scabra</i> Moench	I	68	94,24	AR	LC		43			
<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	I	1	99,92	E	CR*					Indigénat à confirmer en Auvergne (pour les mentions récentes). Non revu depuis les années 1970 dans les stations où il semblait indigène
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	I	153	87,03	PC	LC		03			La cotation correspond à la subsp. <i>bifolia</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	I	133	88,73	PC	LC		03			
<i>Poa alpina</i> L.	I	13	98,90	RR	LC		15 ; 43 ; 63			
<i>Poa annua</i> L.	I	1122	4,92	CC	LC					
<i>Poa bulbosa</i> L.	I	530	55,08	C	LC					
<i>Poa chaixii</i> Vill.	I	296	74,92	AC	LC		03			
<i>Poa compressa</i> L.	I	703	40,42	C	LC					
<i>Poa nemoralis</i> L.	I	1058	10,34	CC	LC					
<i>Poa palustris</i> L.	I	150	87,29	PC	LC					
<i>Poa pratensis</i> L.	I	1017	13,81	CC	LC					
<i>Poa supina</i> Schrad.	I	31	97,37	R	LC		63			La cotation correspond à la var. <i>supina</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Poa trivialis</i> L.	I	1054	10,68	CC	LC					
<i>Polemonium caeruleum</i> L.	I?	14	98,81	RR	VU	D2	15 ; 43		X X	
<i>Polycnemum arvense</i> L.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	15 ; 43 ; 63		EN X	
<i>Polycnemum majus</i> A.Braun	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 15 ; 43 ; 63		X	
<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz	I	13	98,90	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63			
<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	I	27	97,71	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43			La cotation correspond à la subsp. <i>comosa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	I	308	73,90	AC	LC					
<i>Polygala vulgaris</i> L.	I	721	38,90	C	LC					
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	I	682	42,20	C	LC					
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	I	203	82,80	AC	LC					
<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	I	244	79,32	AC	LC		03			
<i>Polygonum aviculare</i> L.	I	1132	4,07	CC	LC					
<i>Polygonum bellardii</i> All.	I?	0	100,00	D?	RE				X	Indigénat à confirmer en Auvergne
<i>Polypodium cambricum</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D	15 ; 63		X	
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	I	234	80,17	AC	LC					
<i>Polypodium vulgare</i> L.	I	756	35,93	CC	LC					
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	I?	5	99,58	E	NE					
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	I	388	67,12	C	LC					
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	I	15	98,73	RR	VU	D1	03 ; 15 ; 43 ; 63		X	
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn.	I	163	86,19	PC	LC					
<i>Populus nigra</i> L.	I	705	40,25	C	LC					
<i>Populus tremula</i> L.	I	1016	13,90	CC	LC					
<i>Portulaca oleracea</i> L.	I	634	46,27	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>oleracea</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	03 ; 63		X	
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63			
<i>Potamogeton bertholdii</i> Fieber	I	15	98,73	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63			

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	I?	1	99,92	E	NE					
<i>Potamogeton crispus</i> L.	I	118	90,00	PC	LC		43			
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	I	0	100,00	D?	RE				X	
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63			
<i>Potamogeton lucens</i> L.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			
<i>Potamogeton natans</i> L.	I	158	86,61	PC	LC					
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63			
<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W.D.J.Koch	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03			
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	I	14	98,81	RR	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	03 ; 63			
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	I	3	99,75	E	EN	B2ab(iii)	03 ; 15 ; 63			
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.	I	122	89,66	PC	LC					
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	63		EN X X	
<i>Potamogeton pusillus</i> L.	I	7	99,41	RR	VU	D2	03 ; 15			
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schltr.	I	5	99,58	E	VU	D2	03 ; 63			
<i>Potentilla anglica</i> Laichard.	I?	0	100,00	D?	NE					
<i>Potentilla anserina</i> L.	I	85	92,80	AR	LC		15 ; 43			
<i>Potentilla argentea</i> L.	I	771	34,66	CC	LC					
<i>Potentilla aurea</i> L.	I	93	92,12	PC	LC		43			
<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Beck ex Fritsch	I	7	99,41	RR	VU	D1	15 ; 43		X	La cotation correspond à la subsp. <i>crantzii</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	I	840	28,81	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>erecta</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	I	268	77,29	AC	LC		03			La cotation correspond à la subsp. <i>fagineicola</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	I	86	92,71	AR	LC					
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	I	743	37,03	C	LC					
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	I	423	64,15	C	LC					
<i>Potentilla recta</i> L.	I	95	91,95	PC	LC					
<i>Potentilla reptans</i> L.	I	951	19,41	CC	LC					
<i>Potentilla rupestris</i> L.	I	51	95,68	AR	LC				X X	La cotation correspond à la subsp. <i>rupestris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	I	941	20,25	CC	LC					
<i>Potentilla supina</i> L.	I	8	99,32	RR	VU	B2ab(iii)	03		X	
<i>Prenanthes purpurea</i> L.	I	416	64,75	C	LC		03			
<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	I	690	41,53	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>elatior</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Primula veris</i> L.	I	954	19,15	CC	LC					
<i>Primula vulgaris</i> Huds.	I	130	88,98	PC	LC					
<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	I	85	92,80	AR	LC		15			
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	I	133	88,73	PC	LC		03			
<i>Prunella hastifolia</i> Brot.	I	55	95,34	AR	LC		43	Endémique franco-ibérique		
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	I	188	84,07	AC	LC					
<i>Prunella vulgaris</i> L.	I	1082	8,31	CC	LC					
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	I	1076	8,81	CC	LC					
<i>Prunus mahaleb</i> L.	I	145	87,71	PC	LC					
<i>Prunus padus</i> L.	I	458	61,19	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>padus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Prunus spinosa</i> L.	I	1110	5,93	CC	LC					
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) A. & D.Love	I	29	97,54	R	LC		43			
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	I	980	16,95	CC	LC					
<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	I	150	87,29	PC	LC		03 ; 15		X	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	I	286	75,76	AC	LC					
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	I	108	90,85	PC	NT	pr. B2b(iii)	43		X X	
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	I	884	25,08	CC	LC					
<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	I?	10	99,15	RR	NE					
<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau	I	154	86,95	PC	LC		43			La cotation correspond à la subsp. <i>longifolia</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Pulmonaria montana</i> Lej.	I	32	97,29	R	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>montana</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre	I	23	98,05	R	LC		63		X X	Taxon représenté en Auvergne a priori par deux sous-espèces, la subsp. <i>alba</i> (menacée) et la subsp. <i>apiifolia</i> (un peu plus fréquente, mais d'intérêt départemental dans le Puy-de-Dôme ; seule sous-espèce de ce taxon protégée en Auvergne)

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre subsp. <i>alba</i> Zamelis	I	7	99,41	RR	NT	pr. D2	63				X	
<i>Pulsatilla rubra</i> Delarbre	I	193	83,64	AC	LC		03	Endémique franco-ibérique				La cotation correspond à la subsp. <i>rubra</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	I	12	98,98	RR	NT	pr. D2	15 ; 43		X	X		
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	I	13	98,90	RR	VU	D1+2	63			X		
<i>Pyrola minor</i> L.	I	184	84,41	AC	LC		03					
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	I	5	99,58	E	EN	D	43 ; 63				X	La cotation correspond à la var. <i>rotundifolia</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Pyrus cordata</i> Desv.	I	17	98,56	RR	DD							
<i>Pyrus pyraister</i> (L.) Du Roi	I	273	76,86	AC	LC							
<i>Pyrus salviifolia</i> DC.	I?	6	99,49	RR	DD							
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	I	816	30,85	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>petraea</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	I	190	83,90	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>pubescens</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Quercus pyrenaica</i> Willd.	I?	1	99,92	E	NE							
<i>Quercus robur</i> L.	I	981	16,86	CC	LC							
<i>Radiola linoides</i> Roth	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i,ii,iii,iv)	03 ; 15 ; 63					
<i>Ranunculus aconitifolius</i> L.	I	482	59,15	C	LC							
<i>Ranunculus acris</i> L.	I	1121	5,00	CC	LC							
<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	I	144	87,80	PC	LC							
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	I	106	91,02	PC	LC		03					
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	I	396	66,44	C	LC							
<i>Ranunculus baudotii</i> Godr.	I	1	99,92	E	DD							
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	I	989	16,19	CC	LC							
<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	I	5	99,58	E	DD							
<i>Ranunculus ficaria</i> L.	I	860	27,12	CC	LC							
<i>Ranunculus flammula</i> L.	I	844	28,47	CC	LC							
<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.	I	36	96,95	R	DD							
<i>Ranunculus hederaceus</i> L.	I	141	88,05	PC	LC		03					
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	43		EN	X	X	
<i>Ranunculus lingua</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i,ii,iii,iv)	03 ; 43		X	X		
<i>Ranunculus montpellicus</i> L.	I	4	99,66	E	VU	B2ab(iii)	43				X	
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	I	5	99,58	E	VU	B2ab(iii)	15 ; 43 ; 63		NT	X	X	
<i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten.	I	40	96,61	R	NT	pr. B2b(iii)					X	
<i>Ranunculus paludosus</i> Poir.	I	16	98,64	RR	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63				X	
<i>Ranunculus parviflorus</i> L.	I?	1	99,92	E	CR	D	63					
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	I	67	94,32	AR	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>peltatus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab.	I	13	98,90	RR	DD							
<i>Ranunculus platanifolius</i> L.	I	46	96,10	AR	LC		03 ; 43 ; 63					
<i>Ranunculus polyanthemoides</i> Boreau	I?	0	100,00	D?	NE							
<i>Ranunculus radians</i> Revel	I?	0	100,00	D?	DD							
<i>Ranunculus repens</i> L.	I	1143	3,14	CC	LC							
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	I	226	80,85	AC	LC		43					
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	I	118	90,00	PC	LC		43					
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	I	21	98,22	R	NT	pr. D2	03 ; 15 ; 43 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>trichophyllus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.	I	308	73,90	AC	LC							
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	I	687	41,78	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>raphanistrum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Reseda lutea</i> L.	I	208	82,37	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Reseda luteola</i> L.	I	396	66,44	C	LC							
<i>Reseda phyteuma</i> L.	I	27	97,71	R	LC		03 ; 43					La cotation correspond à la subsp. <i>phyteuma</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Rhamnus alpina</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	D	15 ; 43				X	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	I	334	71,69	AC	LC							
<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter	I	1	99,92	E	CR	D	15				X	
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	I	224	81,02	AC	LC		03					
<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel.	I?	8	99,32	RR	DD							La cotation correspond à la subsp. <i>grandiflorus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Rhinanthus minor</i> L.	I	701	40,59	C	LC							

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Rhinanthus pumilus</i> (Sterneck) Soldano	I	12	98,98	RR	LC		03 ; 15 ; 63			
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	I	29	97,54	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63		X X	
<i>Ribes alpinum</i> L.	I	710	39,83	C	LC					
<i>Ribes petraeum</i> Wulfen	I	161	86,36	PC	LC					
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	I	648	45,08	C	LC					
<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	I	533	54,83	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>canina</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	I	184	84,41	AC	LC		15			
<i>Rorippa aspera</i> (L.) Maire	I	11	99,07	RR	VU	D1+2	03 ; 15 ; 43 ; 63		X	La cotation correspond à la subsp. <i>aspera</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	I	237	79,92	AC	LC					
<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.	I	207	82,46	AC	LC					La cotation correspond à la var. <i>pyrenaica</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	I	144	87,80	PC	LC					
<i>Rosa agrestis</i> Savi	I	59	95,00	AR	LC		03 ; 15			
<i>Rosa arvensis</i> Huds.	I	750	36,44	CC	LC					
<i>Rosa caesia</i> Sm.	I	19	98,39	R	DD					
<i>Rosa canina</i> L.	I	767	35,00	CC	LC					
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	I	84	92,88	AR	LC					
<i>Rosa elliptica</i> Tausch	I	18	98,47	R	DD					
<i>Rosa ferruginea</i> Vill.	I	66	94,41	AR	LC		43			
<i>Rosa gallica</i> L.	I?	8	99,32	RR	VU	D2	03 ; 63		X X	
<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm.	I	109	90,76	PC	DD					
<i>Rosa mollis</i> Sm.	I	8	99,32	RR	DD					
<i>Rosa obtusifolia</i> Desv.	I	18	98,47	R	DD					
<i>Rosa pendulina</i> L.	I	64	94,58	AR	LC					
<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	I	31	97,37	R	LC		43 ; 63			
<i>Rosa pouzinii</i> Tratt.	I	0	100,00	D?	RE					
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	I	113	90,42	PC	LC		03 ; 15			
<i>Rosa sherardii</i> Davies	I	10	99,15	RR	DD					
<i>Rosa squarrosa</i> (Rau) Boreau	I	112	90,51	PC	LC		03			
<i>Rosa stylosa</i> Desv.	I	7	99,41	RR	DD					
<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	I	38	96,78	R	LC		03 ; 15 ; 43			
<i>Rosa trachyphylla</i> Rau	I?	0	100,00	D?	DD					
<i>Rosa villosa</i> L.	I	25	97,88	R	DD					La cotation correspond à la subsp. <i>villosa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Rosa vosagiaca</i> Desp.	I	57	95,17	AR	DD					
<i>Rubia peregrina</i> L.	I	37	96,86	R	LC		03 ; 43 ; 63			La cotation correspond à la subsp. <i>peregrina</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Rubus adsctus</i> Genev.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus apiculatus</i> Weihe & Nees	I	1	99,92	E	DD					
<i>Rubus bifrons</i> Vest ex Tratt.	I	263	77,71	AC	LC					
<i>Rubus boraeanus</i> Genev.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus caesius</i> L.	I	349	70,42	AC	LC					
<i>Rubus canescens</i> DC.	I	54	95,42	AR	LC					
<i>Rubus chloocladus</i> W.C.R.Watson	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus collicola</i> Sudre	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	I	35	97,03	R	LC					
<i>Rubus divaricatus</i> P.J.Mull.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus foliosus</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus fruticosus</i> L.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus fuscater</i> Weihe & Nees	I	1	99,92	E	DD					
<i>Rubus fuscus</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus genevierii</i> Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus glandulosus</i> Bellardi	I	4	99,66	E	DD					
<i>Rubus godronii</i> Lecoq & Lamotte	I	2	99,83	E	DD					
<i>Rubus grabowskii</i> Weihe ex Günther, Schummel, Wimm. & Grab.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus gracilis</i> C.Presl	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus gremlii</i> Focke	I	3	99,75	E	DD					

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Rubus hirtus</i> Waldst. & Kit.	I	67	94,32	AR	LC					
<i>Rubus hirtus</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus idaeus</i> L.	I	724	38,64	C	LC					
<i>Rubus infestus</i> Weihe & Boenn.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus koehleri</i> Weihe & Nees	I	9	99,24	RR	DD					
<i>Rubus lejeunei</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus macrophyllus</i> Weihe & Nees	I	1	99,92	E	DD					
<i>Rubus melanoxylon</i> P.J.Mull. & Wirtg. ex Genév.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus menkei</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus montanus</i> Lib. ex Lej.	I	13	98,90	RR	DD					
<i>Rubus mucronulatus</i> Boreau	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus myricae</i> Focke	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus nemorosus</i> Hayne	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus nessensis</i> Hall	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus obscurus</i> Kaltentb.	I	1	99,92	E	DD					
<i>Rubus pallidus</i> Weihe & Nees	I	2	99,83	E	DD					
<i>Rubus pedatifolius</i> Genev.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus pilocarpus</i> Gremli	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus praecox</i> Bertol.	I	1	99,92	E	DD					
<i>Rubus pyramidalis</i> Kaltentb.	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus questieri</i> P.J.Mull. & Lefèvre	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus radula</i> Weihe ex Boenn.	I	8	99,32	RR	DD					
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus rhombifolius</i> Weihe ex Boenn.	I	1	99,92	E	DD					
<i>Rubus rivularis</i> P.J.Mull. & Wirtg.	I	1	99,92	E	DD					
<i>Rubus rosaceus</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus rudis</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus saxatilis</i> L.	I	20	98,31	R	LC		43 ; 63			
<i>Rubus scaber</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus schleicheri</i> Weihe ex Tratt.	I	2	99,83	E	DD					
<i>Rubus semicarpinifolius</i> Sudre	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus serpens</i> Weihe ex Lej. & Courtois	I	3	99,75	E	DD					
<i>Rubus silvaticus</i> Weihe & Nees	I	3	99,75	E	DD					
<i>Rubus sprengelii</i> Weihe	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus sulcatus</i> Vest	I	0	100,00	D?	DD					
<i>Rubus thyrsoiflorus</i> Weihe & Nees	I	2	99,83	E	DD					
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	I	264	77,63	AC	LC					
<i>Rubus vallisparvus</i> Sudre	I	1	99,92	E	DD					
<i>Rubus vestitus</i> Weihe & Nees	I	22	98,14	R	DD					
<i>Rubus vulgaris</i> Weihe & Nees	I	1	99,92	E	DD					
<i>Rumex acetosa</i> L.	I	1140	3,39	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>acetosa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Rumex acetosella</i> L.	I	1117	5,34	CC	LC					
<i>Rumex alpinus</i> L.	I	72	93,90	AR	LC		43			
<i>Rumex aquaticus</i> L.	I	0	100,00	D?	RE			VU	X	
<i>Rumex arifolius</i> All.	I	54	95,42	AR	LC					
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	I	568	51,86	C	LC					
<i>Rumex crispus</i> L.	I	994	15,76	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>crispus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	I	3	99,75	E	EN	CR (D) (-1)	03			
<i>Rumex longifolius</i> DC.	I?	30	97,46	R	DD					
<i>Rumex maritimus</i> L.	I	29	97,54	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63			
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	I	1083	8,22	CC	LC					
<i>Rumex palustris</i> Sm.	I	2	99,83	E	CR	D	03			
<i>Rumex pulcher</i> L.	I	272	76,95	AC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>pulcher</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Rumex sanguineus</i> L.	I	460	61,02	C	LC					
<i>Rumex scutatus</i> L.	I	9	99,24	RR	VU	D1	15 ; 63		X	
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	I	92	92,20	PC	LC		63			

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Sagina apetala</i> Ard.	I	447	62,12	C	LC							
<i>Sagina procumbens</i> L.	I	652	44,75	C	LC							
<i>Sagina saginoides</i> (L.) H.Karst.	I	10	99,15	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63					
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	I	24	97,97	R	LC		15 ; 63					
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63		X	X		
<i>Salix alba</i> L.	I	676	42,71	C	LC							
<i>Salix atrocinerea</i> Brot.	I	743	37,03	C	LC							
<i>Salix aurita</i> L.	I	394	66,61	C	LC							
<i>Salix bicolor</i> Willd.	I	57	95,17	AR	LC		43		X	X		
<i>Salix caprea</i> L.	I	997	15,51	CC	LC							
<i>Salix cinerea</i> L.	I	596	49,49	C	LC							
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	I	6	99,49	RR	VU	EN (D) (-1)	15 ; 43					La cotation correspond à la subsp. <i>angustifolia</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Salix fragilis</i> L.	I	113	90,42	PC	LC		03					
<i>Salix hastata</i> L.	I	3	99,75	E	EN	D	15			X		
<i>Salix herbacea</i> L.	I	1	99,92	E	CR	D	63		X	X		
<i>Salix lapponum</i> L.	I	30	97,46	R	LC		15 ; 43		LC	X	X	
<i>Salix pentandra</i> L.	I	178	84,92	PC	LC							
<i>Salix purpurea</i> L.	I	506	57,12	C	LC							
<i>Salix repens</i> L.	I	144	87,80	PC	LC		03					La cotation correspond à la subsp. <i>repens</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Salix triandra</i> L.	I	142	87,97	PC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>triandra</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Salix viminalis</i> L.	I?	114	90,34	PC	LC							
<i>Salvia aethiops</i> L.	I	5	99,58	E	VU	D2	43 ; 63			X		
<i>Salvia pratensis</i> L.	I	302	74,41	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>pratensis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Salvia verbenaca</i> L.	I	31	97,37	R	LC		03 ; 15 ; 43					
<i>Sambucus ebulus</i> L.	I	334	71,69	AC	LC							
<i>Sambucus nigra</i> L.	I	1110	5,93	CC	LC							
<i>Sambucus racemosa</i> L.	I	598	49,32	C	LC							
<i>Samolus valerandi</i> L.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X		
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	I	986	16,44	CC	LC							
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	I	329	72,12	AC	LC		03					
<i>Sanguisorba verrucosa</i> (Link ex G.Don) Ces.	I	0	100,00	D?	NE							
<i>Sanicula europaea</i> L.	I	309	73,81	AC	LC							
<i>Saponaria ocymoides</i> L.	I	113	90,42	PC	LC		03					La cotation correspond à la subsp. <i>ocymoides</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Saponaria officinalis</i> L.	I	731	38,05	C	LC							
<i>Saxifraga androsacea</i> L.	I	3	99,75	E	VU	D1	15		X	X		
<i>Saxifraga bryoides</i> L.	I	4	99,66	E	NT	pr. D1	15 ; 63		X	X		
<i>Saxifraga exarata</i> Vill.	I	3	99,75	E	VU	D1	15 ; 63	Endémique Massif central	VU	X	X	La cotation correspond à la subsp. <i>lamottei</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Saxifraga fragosoi</i> Sennen	I	210	82,20	AC	LC			Endémique franco-ibérique				
<i>Saxifraga granulata</i> L.	I	685	41,95	C	LC							
<i>Saxifraga hieraciifolia</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	I	3	99,75	E	CR	D	15		CR	X	X	
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	I	3	99,75	E	VU	D1	15			X	X	
<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	I	58	95,08	AR	LC		63					
<i>Saxifraga pedemontana</i> All.	I	4	99,66	E	VU	D1	15	Endémique Massif central	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>prostii</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	I	98	91,69	PC	LC							
<i>Saxifraga stellaris</i> L.	I	80	93,22	AR	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>robusta</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	I	131	88,90	PC	LC							
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	I	745	36,86	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>columbaria</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	I	54	95,42	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 15					La cotation correspond à la subsp. <i>pecten-veneris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X	X		
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	I	88	92,54	PC	LC		15			X		
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	03 ; 63			X		
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	I	2	99,83	E	EN	D	03 ; 63			X		
<i>Schoenus nigricans</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D	15			X		

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Scilla bifolia</i> L.	I	201	82,97	AC	LC					
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	I	0	100,00	D?	RE					La cotation correspond à la subsp. <i>holoschoenus</i> , seule sous-espèce citée en Auvergne
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	I	930	21,19	CC	LC					
<i>Scleranthus annuus</i> L.	I	587	50,25	C	LC					
<i>Scleranthus perennis</i> L.	I	574	51,36	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>perennis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Scleranthus polycarpus</i> L.	I	254	78,47	AC	LC					
<i>Scleranthus uncinatus</i> Schur	I	102	91,36	PC	LC		43			
<i>Sclerochloa dura</i> (L.) P.Beauv.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	63		X	
<i>Scorzonera humilis</i> L.	I	533	54,83	C	LC					
<i>Scorzonera laciniata</i> L.	I	43	96,36	AR	LC		15			
<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> (L.) Moench	I	922	21,86	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>autumnalis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Scorzoneroïdes pyrenaica</i> (Gouan) Holub	I	100	91,53	PC	LC					
<i>Scrophularia alpestris</i> J.Gay ex Benth.	I	8	99,32	RR	VU	D2	15			
<i>Scrophularia auriculata</i> Loeffl. ex L.	I	168	85,76	PC	LC		15 ; 43			
<i>Scrophularia canina</i> L.	I	89	92,46	PC	LC		15			
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	I	1048	11,19	CC	LC					
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	I	448	62,03	C	LC					
<i>Scutellaria minor</i> Huds.	I	211	82,12	AC	LC					
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	I	242	79,49	AC	LC					
<i>Sedum acre</i> L.	I	676	42,71	C	LC					
<i>Sedum album</i> L.	I	571	51,61	C	LC					
<i>Sedum alpestre</i> Vill.	I	22	98,14	R	LC		43 ; 63			
<i>Sedum amplexicaule</i> DC.	I?	0	100,00	D?	RE				VU	
<i>Sedum annuum</i> L.	I	120	89,83	PC	LC					
<i>Sedum anopetalum</i> DC.	I	4	99,66	E	VU	D2	15			
<i>Sedum cepaea</i> L.	I	165	86,02	PC	LC					
<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	I	276	76,61	AC	LC		03			
<i>Sedum forsterianum</i> Sm.	I	224	81,02	AC	LC					
<i>Sedum hirsutum</i> All.	I	301	74,49	AC	LC		03			
<i>Sedum rubens</i> L.	I	341	71,10	AC	LC					
<i>Sedum rupestre</i> L.	I	797	32,46	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>rupestre</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	I?	2	99,83	E	NE					
<i>Sedum sexangulare</i> L.	I	36	96,95	R	NT	pr. B2b(iii)	63			
<i>Sedum villosum</i> L.	I	106	91,02	PC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>villosum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart.	I	0	100,00	D?	RE					
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	I	14	98,81	RR	NT	pr. D2	03 ; 15 ; 63			
<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	I	84	92,88	AR	LC		03			
<i>Sempervivum tectorum</i> L.	I	254	78,47	AC	LC		03		X X	Seule la subsp. <i>arvernensis</i> était citée dans la liste rouge régionale précédente. De plus, elle est protégée en Auvergne
<i>Senecio cacaliastr</i> Lam.	I	91	92,29	PC	LC		43			
<i>Senecio doronicum</i> (L.) L.	I	46	96,10	AR	LC		43			
<i>Senecio lividus</i> L.	I	19	98,39	R	NT	pr. D1+2	15 ; 43 ; 63		X	
<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	I	523	55,68	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>alpestris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Senecio sylvaticus</i> L.	I	623	47,20	C	LC					
<i>Senecio viscosus</i> L.	I	722	38,81	C	LC					
<i>Senecio vulgaris</i> L.	I	1059	10,25	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>vulgaris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Serapias lingua</i> L.	I	38	96,78	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43		X	
<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq.	I	1	99,92	E	CR*				X	Apparemment non revu récemment
<i>Serratula tinctoria</i> L.	I	253	78,56	AC	LC					
<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.Lopez	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03			La cotation correspond à la subsp. <i>purpurascens</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Sesamoides pygmaea</i> (Scheele) Kuntze	I	6	99,49	RR	NT	pr. D2	15 ; 63		X X	La cotation correspond à la var. <i>sesamoides</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Seseli annuum</i> L.	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63		X	La cotation correspond à la subsp. <i>annuum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Seseli montanum</i> L.	I	45	96,19	AR	NT	pr. B2b(iii)	15			
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	I	347	70,59	AC	LC					
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	I	302	74,41	AC	LC					
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	I	643	45,51	C	LC					

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Sherardia arvensis</i> L.	I	251	78,73	AC	LC							La cotation correspond à la var. <i>arvensis</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	I	60	94,92	AR	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 43					
<i>Silene armeria</i> L.	I	92	92,20	PC	LC		03					
<i>Silene ciliata</i> Pourr.	I	5	99,58	E	VU	D2	15 ; 63		X	X		
<i>Silene conica</i> L.	I?	2	99,83	E	NE							
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	I	867	26,53	CC	LC							La cotation correspond à la var. <i>dioica</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	I	834	29,32	CC	LC							
<i>Silene gallica</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63					
<i>Silene latifolia</i> Poir.	I	979	17,03	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>alba</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Silene noctiflora</i> L.	I?	14	98,81	RR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43 ; 63			X		Indigénat à confirmer en Auvergne
<i>Silene nutans</i> L.	I	783	33,64	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>nutans</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel	I	43	96,36	AR	NT	pr. B2b(iii)						
<i>Silene rupestris</i> L.	I	45	96,19	AR	LC		63				X	
<i>Silene saxifraga</i> L.	I	21	98,22	R	NT	pr. D1+2						
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	I	1005	14,83	CC	LC							
<i>Simethis mattiazii</i> (Vand.) G.Lopez & Jarvis	I	21	98,22	R	LC		03				X	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	I	309	73,81	AC	LC							
<i>Sison amomum</i> L.	I	24	97,97	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	15 ; 63					
<i>Sison segetum</i> L.	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63				X	
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	I?	8	99,32	RR	NE							
<i>Sisymbrium irio</i> L.	I?	20	98,31	R	NE							
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	I	854	27,63	CC	LC							
<i>Stium latifolium</i> L.	I	0	100,00	D?	RE						X	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	I	685	41,95	C	LC							
<i>Solanum nigrum</i> L.	I	624	47,12	C	LC							
<i>Solanum villosum</i> Mill.	I?	15	98,73	RR	NE							
<i>Soldanella alpina</i> L.	I	2	99,83	E	VU	D2	63		X	X		
<i>Solidago virgaurea</i> L.	I	771	34,66	CC	LC							
<i>Sonchus arvensis</i> L.	I	282	76,10	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>arvensis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	I	1066	9,66	CC	LC							
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	I	792	32,88	CC	LC							
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	I	744	36,95	C	LC							
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	I	717	39,24	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>aucuparia</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	I	13	98,90	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Sorbus domestica</i> L.	I	78	93,39	AR	LC		15					
<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr.	I	22	98,14	R	VU	D1					X	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	I	250	78,81	AC	LC							
<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	I	79	93,31	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)						
<i>Sparganium erectum</i> L.	I	384	67,46	C	LC							
<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	I	8	99,32	RR	EN	D	15 ; 43 ; 63					
<i>Spergula arvensis</i> L.	I	548	53,56	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>arvensis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	I	174	85,25	PC	LC							
<i>Spergula pentandra</i> L.	I	86	92,71	AR	LC		03 ; 15					
<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser	I	2	99,83	E	RE							Indigénat à confirmer en Auvergne (pour les mentions récentes). Disparu de ses stations indigènes depuis longtemps
<i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl	I	8	99,32	RR	VU	D2	43 ; 63		X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>media</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C.Presl	I	856	27,46	CC	LC							
<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G.Don	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Spiraea hypericifolia</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D	15					Une partie des données se rapporte à des plantes cultivées (subsp. <i>hypericifolia</i>), la cotation concerne donc uniquement la sous-espèce indigène (subsp. <i>obovata</i>)
<i>Spiraea hypericifolia</i> L. subsp. <i>obovata</i> (Willd.) H.Huber	I	1	99,92	E	EN	D	15	Endémique franco-ibérique				
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15		VU	X	X	
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	I	56	95,25	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iv) D1	03					
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	I	114	90,34	PC	LC		15 ; 43					
<i>Stachys alpina</i> L.	I	229	80,59	AC	LC							

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	I	95	91,95	PC	LC		15 ; 43			
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	I	113	90,42	PC	LC		15 ; 43			
<i>Stachys germanica</i> L.	I	45	96,19	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43			
<i>Stachys heraclea</i> All.	I	1	99,92	E	EN	D	63		X X	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	I	808	31,53	CC	LC					
<i>Stachys palustris</i> L.	I	91	92,29	PC	LC		15			
<i>Stachys recta</i> L.	I	220	81,36	AC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>recta</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Stachys sylvatica</i> L.	I	952	19,32	CC	LC					
<i>Staezelina dubia</i> L.	I	1	99,92	E	EN	D	15		X	
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	I	827	29,92	CC	LC					
<i>Stellaria graminea</i> L.	I	1036	12,20	CC	LC					
<i>Stellaria holostea</i> L.	I	1119	5,17	CC	LC					
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	I	1108	6,10	CC	LC					
<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	I	296	74,92	AC	LC					
<i>Stellaria nemorum</i> L.	I	331	71,95	AC	LC					
<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré	I	27	97,71	R	DD					
<i>Stipa eriocalis</i> Borbás	I	0	100,00	D?	CR*				X	La cotation correspond à la subsp. <i>lutetiana</i> , seule sous-espèce citée en Auvergne
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	I	25	97,88	R	LC		43 ; 63		X X	
<i>Succisa pratensis</i> Moench	I	767	35,00	CC	LC					
<i>Swertia perennis</i> L.	I	5	99,58	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 63		X X	
<i>Symphytum officinale</i> L.	I	308	73,90	AC	LC					
<i>Symphytum tuberosum</i> L.	I	97	91,78	PC	LC		03			
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	I	31	98,14	R	NT	pr. B2b(i, ii)	03 ; 15 ; 43 ; 63			
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	I	377	68,05	C	LC					
<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Homem.) Hand.-Mazz.	I	6	99,49	RR	VU	D2	63		VU X X	
<i>Taraxacum sect. Celtica</i> Richards	I	6	99,49	RR	DD					
<i>Taraxacum sect. Erythrosperma</i> (Lindb.f.) Dahlst.	I	245	79,24	AC	LC					
<i>Taraxacum sect. Hamata</i> Oellgaard	I	19	98,39	R	DD					
<i>Taraxacum sect. Leptocephala</i> Soest	I	6	99,49	RR	DD					
<i>Taraxacum sect. Palustris</i> (Lindb.f.) Dahlst.	I	15	98,73	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63			
<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i> Kirschner, Oellgaard & Stepanek	I	1078	8,64	CC	LC					
<i>Taraxacum udum</i> Jord.	I?	0	100,00	D?	NE					
<i>Teesdalia coronopifolia</i> (J.P.Bergeret) Thell.	I	6	99,49	RR	DD		43			
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.	I	608	48,47	C	LC					
<i>Tephrosia helenitis</i> (L.) B.Nord.	I	103	91,27	PC	LC					
<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth	I	16	98,64	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63		X	La cotation correspond à la var. <i>maritimus</i> , seule variété citée en Auvergne
<i>Teucrium botrys</i> L.	I	94	92,03	PC	LC		03			
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	I	129	89,07	PC	LC					
<i>Teucrium montanum</i> L.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	63		X	
<i>Teucrium scordium</i> L.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03		X	La cotation correspond à la subsp. <i>scordium</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	I	1047	11,27	CC	LC					
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	I	38	96,78	R	NT	pr. D1	15			
<i>Thalictrum flavum</i> L.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63			La cotation correspond à la subsp. <i>flavum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Thalictrum minus</i> L.	I	56	95,25	AR	LC		03 ; 15 ; 43			
<i>Thalictrum simplex</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D	15			
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	I	4	99,66	E	EN	B2ab(iii)	03 ; 15		X	
<i>Thesium alpinum</i> L.	I	126	89,32	PC	LC					
<i>Thesium humifusum</i> DC.	I	75	93,73	AR	NT	pr. B2b(iii)	15		X	La cotation concerne la sous-espèce <i>humifusum</i> ; la sous-espèce <i>divaricatum</i> , quant à elle, est méconnue (cotation DD). Seule cette dernière sous-espèce était citée dans la liste rouge régionale précédente
<i>Thesium humifusum</i> DC. subsp. <i>humifusum</i>	I	70	94,07	AR	NT	pr. B2b(iii)	15			
<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	I	57	95,17	AR	LC					
<i>Thlaspi alliaceum</i> L.	I	57	95,17	AR	LC					
<i>Thlaspi arvense</i> L.	I	357	69,75	AC	LC					
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 43			

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Thymus froelichianus</i> Opiz	I	10	99,15	RR	NE					
<i>Thymus jaquetianus</i> (Ronniger) Debray	I	0	100,00	D?	NE					
<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás	I	263	77,71	AC	LC		03			
<i>Thymus praecox</i> Opiz	I	46	96,10	AR	LC		03 ; 15			
<i>Thymus pseudochamaedrys</i> (Heinr.Braun) Ronniger	?	4	99,66	E	NE					
<i>Thymus pulegioides</i> L.	I	902	23,56	CC	LC					
<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm.	I	27	97,71	R	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 63		X	
<i>Tilia cordata</i> Mill.	I	300	74,58	AC	LC					
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	I	593	49,75	C	LC					
<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	I	2	99,83	E	VU	D2	15		X	La cotation correspond à la subsp. <i>umbellata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Tordylium maximum</i> L.	I	155	86,86	PC	LC					
<i>Torilis africana</i> Spreng.	I	10	99,15	RR	DD					
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	I	258	78,14	AC	LC					
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	I	949	19,58	CC	LC					
<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Rchb.f.	I	4	99,66	E	EN	D	15 ; 43			
<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn.	I	26	97,80	R	LC		03 ; 15 ; 43 ; 63			La cotation correspond à la subsp. <i>nodosa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Tozzia alpina</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D	15		X X	
<i>Tractema lilio-hyacinthus</i> (L.) Speta	I	169	85,68	PC	LC		43	Endémique franco-ibérique		
<i>Tragopogon crocifolius</i> L.	I	8	99,32	RR	EN	B2ab(i,ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X	
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	I	101	91,44	PC	LC		03 ; 15			La cotation correspond à la subsp. <i>major</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	I	862	26,95	CC	LC					
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	?	80	93,22	AR	LC					
<i>Trapa natans</i> L.	I	18	98,47	R	NT	pr. B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63		X	
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	I	7	99,41	RR	VU	D1	15 ; 43		X X	
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	I	10	99,15	RR	EN	D	15 ; 63		X	
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	I	78	93,39	AR	LC		03			
<i>Trifolium alpestre</i> L.	I	36	96,95	R	LC		15 ; 63			
<i>Trifolium alpinum</i> L.	I	40	96,61	R	LC		43			
<i>Trifolium arvense</i> L.	I	794	32,71	CC	LC					
<i>Trifolium aureum</i> Pollich	I	64	94,58	AR	LC		03			
<i>Trifolium badium</i> Schreb.	I	12	98,98	RR	EN	D	15 ; 43 ; 63			
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	I	749	36,53	C	LC					
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	I	968	17,97	CC	LC					
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	I	93	92,12	PC	LC		15 ; 43			
<i>Trifolium glomeratum</i> L.	I	70	94,07	AR	LC		03 ; 15			
<i>Trifolium hybridum</i> L.	I	543	53,98	C	LC					
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	I	342	71,02	AC	LC					
<i>Trifolium maritimum</i> Huds.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63		X	La cotation correspond à la subsp. <i>maritimum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Trifolium medium</i> L.	I	287	75,68	AC	LC					
<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	I	7	99,41	RR	VU	B2ab(iii) D2	03 ; 15 ; 43 ; 63		X	
<i>Trifolium montanum</i> L.	I	32	97,29	R	LC		15 ; 63			La cotation correspond à la subsp. <i>montanum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Trifolium nigrescens</i> Viv.	?	3	99,75	E	NE					
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	I	219	81,44	AC	LC		03			
<i>Trifolium ornithopodioides</i> L.	I	4	99,66	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 43 ; 63		X	
<i>Trifolium pallescens</i> Schreb.	I	4	99,66	E	VU	D1	15 ; 63		X X	
<i>Trifolium patens</i> Schreb.	?	0	100,00	D?	NE					
<i>Trifolium pratense</i> L.	I	1159	1,78	CC	LC					
<i>Trifolium repens</i> L.	I	1137	3,64	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>repens</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Trifolium retusum</i> L.	I	6	99,49	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63	VU	X	
<i>Trifolium rubens</i> L.	I	98	91,69	PC	LC		03			
<i>Trifolium scabrum</i> L.	I	80	93,22	AR	LC		03 ; 15			La cotation correspond à la subsp. <i>scabrum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Trifolium spadiceum</i> L.	I	166	85,93	PC	LC		03			
<i>Trifolium striatum</i> L.	I	455	61,44	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>striatum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Trifolium strictum</i> L.	I	9	99,24	RR	VU	D2	03 ; 43 ; 63				X	
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	I	106	91,02	PC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>subterraneum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Triglochin maritimum</i> L.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	63		X	X		
<i>Triglochin palustre</i> L.	I	12	98,98	RR	VU	D2	15 ; 63				X	
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	I	36	96,95	R	LC		15					
<i>Tripleurospermum inodorum</i> Sch.Bip.	I	1045	11,44	CC	LC							
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	I	929	21,27	CC	LC							
<i>Trollius europaeus</i> L.	I	234	80,17	AC	LC							
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	I	40	96,61	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63				X	
<i>Tulipa sylvestris</i> L.	I	19	98,39	R	NT	pr. D2	15 ; 43 ; 63				X	Les deux sous-espèces de <i>Tulipa sylvestris</i> présentes en Auvergne (subsp. <i>australis</i> et subsp. <i>sylvestris</i>) sont toutes deux menacées
<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.	I	12	98,98	RR	NT	pr. D2	15 ; 43				X	
<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	I?	7	99,41	RR	VU	D2	43 ; 63		X	X		
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	43 ; 63				X	
<i>Turritis glabra</i> L.	I	351	70,25	AC	LC							
<i>Tussilago farfara</i> L.	I	552	53,22	C	LC							
<i>Typha angustifolia</i> L.	I	33	97,20	R	LC		15 ; 43 ; 63					
<i>Typha latifolia</i> L.	I	616	47,80	C	LC							
<i>Ulex europaeus</i> L.	I	323	72,63	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>europaeus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Ulex minor</i> Roth	I	159	86,53	PC	LC		15					
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	I	518	56,10	C	LC							
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	I	79	93,31	AR	NT	pr. D1	15 ; 43		X	X		
<i>Ulmus minor</i> Mill.	I	594	49,66	C	LC							
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	I	201	82,97	AC	LC		03					
<i>Urtica dioica</i> L.	I	1155	2,12	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>dioica</i> , apparemment seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Urtica urens</i> L.	I	68	94,24	AR	LC		15					
<i>Utricularia australis</i> R.Br.	I	43	96,36	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	I	1	99,92	E	CR*				VU	X		Apparemment non revu récemment
<i>Utricularia minor</i> L.	I	12	98,98	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	I?	4	99,66	E	RE						X	Indigénat à confirmer en Auvergne (pour les mentions récentes). Disparu de ses stations indigènes depuis longtemps. La cotation correspond à la var. <i>hispanica</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	I	36	96,95	R	NT	pr. B2(iii)	03 ; 15 ; 43		X	X		
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	I	577	51,10	C	LC							
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	I	57	95,17	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43		X	X		
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	I	76	93,56	AR	LC		03 ; 43					
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	I	47	96,02	AR	LC		63					
<i>Valeriana dioica</i> L.	I	563	52,29	C	LC							
<i>Valeriana officinalis</i> L.	I	992	15,93	CC	LC							
<i>Valeriana tripteris</i> L.	I	287	75,68	AC	LC		03					
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	I	710	39,83	C	LC							
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	I	0	100,00	D?	RE						X	
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	I	55	95,34	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 63					
<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	I?	5	99,58	E	NE							
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	I	501	57,54	C	LC							
<i>Valerianella rimosa</i> Bastard	I	63	94,66	AR	LC							
<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) Kunkel	I	2	99,83	E	NT	pr. B2a D2	15		LC	X		
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.	I	46	96,10	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)					X	
<i>Veratrum album</i> L.	I	266	77,46	AC	LC		03					
<i>Verbascum blattaria</i> L.	I	83	92,97	AR	LC		15					
<i>Verbascum boerhaviai</i> L.	I	12	98,98	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63					
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	I	366	68,98	AC	LC							
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	I	515	56,36	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>lychnitis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Verbascum nigrum</i> L.	I	572	51,53	C	LC							
<i>Verbascum phlomoides</i> L.	I	78	93,39	AR	LC		15					
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	I	407	65,51	C	LC							
<i>Verbascum thapsus</i> L.	I	847	28,22	CC	LC							

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	I	50	95,76	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	43					
<i>Verbena officinalis</i> L.	I	790	33,05	CC	LC							
<i>Veronica acinifolia</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63			X		
<i>Veronica agrestis</i> L.	I	125	89,41	PC	LC							
<i>Veronica alpina</i> L.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	15			X		
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	I	199	83,14	AC	LC							
<i>Veronica arvensis</i> L.	I	1055	10,59	CC	LC							
<i>Veronica austriaca</i> L.	I	52	95,59	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 15 ; 63					
<i>Veronica beccabunga</i> L.	I	859	27,20	CC	LC							
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	I	1108	6,10	CC	LC							
<i>Veronica dillenii</i> Crantz	I	165	86,02	PC	LC		03					
<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	63			X		
<i>Veronica hederifolia</i> L.	I	802	32,03	CC	LC							
<i>Veronica montana</i> L.	I	283	76,02	AC	LC							
<i>Veronica officinalis</i> L.	I	903	23,47	CC	LC							
<i>Veronica polita</i> Fr.	I	164	86,10	PC	LC							
<i>Veronica praecox</i> All.	I	15	98,73	RR	VU	D2	03 ; 43 ; 63					
<i>Veronica prostrata</i> L.	I	51	95,68	AR	LC		15 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>scheereri</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Veronica scutellata</i> L.	I	397	66,36	C	LC							
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	I	869	26,36	CC	LC							
<i>Veronica spicata</i> L.	I	20	98,31	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63		X	X		
<i>Veronica triphyllos</i> L.	I	66	94,41	AR	LC		15					
<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	I	6	99,49	RR	VU	D2	15			X		
<i>Veronica verna</i> L.	I	180	84,75	PC	LC		03					La cotation correspond à la subsp. <i>verna</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Viburnum lantana</i> L.	I	424	64,07	C	LC							
<i>Viburnum opulus</i> L.	I	648	45,08	C	LC							
<i>Vicia articulata</i> Hornem.	I?	1	99,92	E	CR*					X		Indigénat à confirmer en Auvergne. Apparemment non revu récemment
<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.	I	6	99,49	RR	EN	D	15 ; 63			X		
<i>Vicia cracca</i> L.	I	882	25,25	CC	LC							
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	I	1020	13,56	CC	LC							
<i>Vicia hybrida</i> L.	I?	9	99,24	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	63			X		
<i>Vicia johannis</i> Tamamsch.	I?	1	99,92	E	DD					X		
<i>Vicia lathyroides</i> L.	I	152	87,12	PC	LC							
<i>Vicia lutea</i> L.	I	199	83,14	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Vicia melanops</i> Sm.	I?	15	98,73	RR	VU	D2			LC	X		Indigénat à confirmer en Auvergne
<i>Vicia narbonensis</i> L.	I	43	96,36	AR	NT	pr. D2	43			X		
<i>Vicia onobrychioides</i> L.	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63					
<i>Vicia orobus</i> DC.	I	87	92,63	AR	LC		43					
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	I?	85	92,80	AR	LC							
<i>Vicia peregrina</i> L.	I?	3	99,75	E	NE					X		
<i>Vicia sativa</i> L.	I	1045	11,44	CC	LC							
<i>Vicia sepium</i> L.	I	1077	8,73	CC	LC							
<i>Vicia serratifolia</i> Jacq.	I	37	96,86	R	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43			X		
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	I	151	87,20	PC	LC		15					
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	I	463	60,76	C	LC							
<i>Vicia villosa</i> Roth	I	213	81,95	AC	LC							
<i>Vinca minor</i> L.	I	519	56,02	C	LC							
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	I	165	86,02	PC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>hirundinaria</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Viola alba</i> Besser	I	39	96,69	R	LC		03 ; 15					
<i>Viola arvensis</i> Murray	I	931	21,10	CC	LC							
<i>Viola biflora</i> L.	I	1	99,92	E	EN	D	63			X		
<i>Viola calcarata</i> L.	I?	2	99,83	E	NE							
<i>Viola canina</i> L.	I	458	61,19	C	LC							
<i>Viola hirta</i> L.	I	529	55,17	C	LC							
<i>Viola kitaibeliana</i> Schult.	I?	5	99,58	E	NE							
<i>Viola lactea</i> Sm.	I	2	99,83	E	CR	D	03 ; 63					

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national Protection réglementaire Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Viola lutea</i> Huds.	I	275	76,69	AC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Viola odorata</i> L.	I	730	38,14	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>odorata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Viola palustris</i> L.	I	409	65,34	C	LC					
<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	I	414	64,92	C	LC					
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	I	829	29,75	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>riviniana</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Viola saxatilis</i> F.W.Schmidt	I	57	95,17	AR	LC		15 ; 43			La cotation correspond à la subsp. <i>saxatilis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Viola suavis</i> M.Bieb.	I?	0	100,00	D?	NE					
<i>Viola tricolor</i> L.	I	291	75,34	AC	LC		03			
<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	I	74	93,73	AR	LC		03			
<i>Viscum album</i> L.	I	673	42,97	C	LC					
<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.	I	7	99,41	RR	VU	D2	15			
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	I	899	23,81	CC	LC					
<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace	I	12	98,98	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43			
<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.	I	181	84,66	PC	LC		43			
<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	I	28	97,63	R	LC		63			
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	I	2	99,83	E	EN	D	15	X X		
<i>Xanthium strumarium</i> L.	I	1	99,92	E	CR*					Apparemment non revu récemment
<i>Xanthoselinum alsaticum</i> (L.) Schur	I	113	90,42	PC	LC		43			
<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm.	I	36	96,95	R	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 43		X	
<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	I	13	98,90	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63		X	
<i>Zannichellia palustris</i> L.	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Agrostis alpina</i> Scop.	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	I?	0	100,00	D?	RE							
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>praepropera</i> (A.Kern.) Bornm.	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Asperula arvensis</i> L.	I	1	99,92	E	RE		43				X	
<i>Beta vulgaris</i> L.	I?	46	96,10	AR	RE							La majorité des données se rapporte à des plantes cultivées (subsp. <i>vulgaris</i>), la cotation concerne donc uniquement la sous-espèce apparemment indigène (subsp. <i>maritima</i>) qui n'a pas été revue depuis longtemps
<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang.	I?	0	100,00	D?	RE							
<i>Callitriche truncata</i> Guss.	I?	0	100,00	D?	RE					X		La cotation correspond à la subsp. <i>occidentalis</i> , seule sous-espèce citée en Auvergne
<i>Campanula erinus</i> L.	I	0	100,00	D?	RE					X		
<i>Cardamine raphanifolia</i> Pourr.	I?	0	100,00	D?	RE							
<i>Cerastium diffusum</i> Pers.	I?	0	100,00	D?	RE							
<i>Ceratocephalus falcatus</i> (L.) Pers.	I?	0	100,00	D?	RE							Indigénat à confirmer en Auvergne
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	I	0	100,00	D?	RE						X	
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	I	0	100,00	D?	RE				VU	X	X	
<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray	I?	0	100,00	D?	RE				VU	X		
<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck.	I	0	100,00	D?	RE							La cotation correspond à la var. <i>seguieriana</i> , seule variété citée en Auvergne
<i>Festuca alpina</i> Suter	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze	I	0	100,00	D?	RE				EN	X	X	
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Lathyrus annuus</i> L.	I?	0	100,00	D?	RE							
<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill.	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Linum strictum</i> L.	I	0	100,00	D?	RE							La cotation correspond à la subsp. <i>strictum</i> , seule sous-espèce citée en Auvergne
<i>Lysimachia linum-stellatum</i> L.	I?	0	100,00	D?	RE							
<i>Nigella arvensis</i> L.	I?	0	100,00	D?	RE				CR			
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel.	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Orobanche montserratii</i> A.Pujadas & D.Gómez	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Phleum arenarium</i> L.	I?	0	100,00	D?	RE							
<i>Polygonum bellardii</i> All.	I?	0	100,00	D?	RE						X	Indigénat à confirmer en Auvergne
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	I	0	100,00	D?	RE						X	
<i>Rosa pouzinii</i> Tratt.	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Rumex aquaticus</i> L.	I	0	100,00	D?	RE				VU		X	
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	I	0	100,00	D?	RE							La cotation correspond à la subsp. <i>holoschoenus</i> , seule sous-espèce citée en Auvergne
<i>Sedum amplexicaule</i> DC.	I?	0	100,00	D?	RE				VU			
<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart.	I	0	100,00	D?	RE							
<i>Stium latifolium</i> L.	I	0	100,00	D?	RE						X	
<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser	I	2	99,83	E	RE							Indigénat à confirmer en Auvergne (pour les mentions récentes). Disparu de ses stations indigènes depuis longtemps
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	I?	4	99,66	E	RE						X	Indigénat à confirmer en Auvergne (pour les mentions récentes). Disparu de ses stations indigènes depuis longtemps. La cotation correspond à la var. <i>hispanica</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	I	0	100,00	D?	RE						X	
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	I	2	99,83	E	CR	D	03 ; 15				X	
<i>Androsace elongata</i> L.	I?	7	99,41	RR	CR	B2ab(i,ii,iii,iv)	63	EN	X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>breistrofferi</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Androsace maxima</i> L.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	43				X	
<i>Anthericum ramosum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i,ii,iii,iv)	03 ; 15				X	
<i>Astragalus hamosus</i> L.	I?	6	99,49	RR	CR	B2ab(i,ii,iii,iv)	43 ; 63				X	
<i>Astrantia minor</i> L.	I	1	99,92	E	CR	D	15				X	
<i>Botrychium matricarifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch	I	2	99,83	E	CR*				VU	X	X	Apparemment non revu récemment
<i>Briza minor</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i,ii,iii,iv)	03 ; 15				X	
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i,ii,iii,iv)	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i,ii,iii,iv)	43 ; 63				X	La cotation correspond à la subsp. <i>sylvestris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	I	4	99,66	E	CR*						X	Une partie des données se rapporte à des plantes cultivées (var. <i>sativa</i>), la cotation concerne donc uniquement la variété indigène (var. <i>pilosa</i>) qui n'a pas été revue récemment
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz var. <i>pilosa</i> DC.	I	0	100,00	D?	CR*						X	

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Campanula cervicaria</i> L.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iv, v) D	03 ; 63		EN	X	X	
<i>Carex chordorrhiza</i> L.f.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63		EN	X	X	
<i>Carex curvula</i> All.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii, v)	63				X	La cotation correspond à la subsp. <i>curvula</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Carex divisa</i> Huds.	I	8	99,32	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>divisa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	63		NT	X	X	
<i>Carex vaginata</i> Tausch	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	63		VU	X	X	
<i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>cynara</i> (Pourr. ex DC.) Arcang.	I	2	99,83	E	CR	D	63			X	X	
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63			X	X	
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v) D	03					
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(iii) D	63				X	
<i>Convolvulus lineatus</i> L.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	63			X	X	
<i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	I	12	98,98	RR	CR	C2a(i)	15 ; 63			X	X	
<i>Crassula vallantii</i> (Willd.) Roth	I	0	100,00	D?	CR*							X
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63					X
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03			X	X	
<i>Cyperus flavescens</i> L.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63					X
<i>Dactylorhiza elata</i> (Poir.) Soó	I	0	100,00	D?	CR*							X
<i>Damasonium alisma</i> Mill.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iv, v) D	03			X	X	La cotation correspond à la subsp. <i>sesquipedalis</i> , seule sous-espèce citée en Auvergne
<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	03					X
<i>Diphasiastrium oellgaardii</i> Stoor & al.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(v)	15		VU	X	X	
<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser.	I?	2	99,83	E	CR*					X		Apparemmement non revu récemment
<i>Drosera anglica</i> Huds.	I?	1	99,92	E	CR*					X	X	Apparemmement non revu récemment
<i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63					
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v) D	03 ; 63			X	X	
<i>Elatine hydropiper</i> L.	I	1	99,92	E	CR*				VU		X	Apparemmement non revu récemment
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	I	4	99,66	E	CR	D	03 ; 63				X	
<i>Erica scoparia</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63					
<i>Erica vagans</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*							
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03					X
<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v) D	15			X	X	
<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	I	1	99,92	E	CR	D	63		CR		X	
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63			X	X	
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	I	1	99,92	E	CR	D	63		NT		X	
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15					
<i>Gratiola officinalis</i> L.	I	9	99,24	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63			X	X	
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15					
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	I	1	99,92	E	CR	D	15					X
<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63					X
<i>Hieracium glanduliferum</i> Hoppe	I	1	99,92	E	CR	D	63					X
<i>Hottonia palustris</i> L.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03					X
<i>Hymenolobus procumbens</i> (L.) Nutt. ex Schinz & Thell.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	63					X
<i>Inula britannica</i> L.	I	8	99,32	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63					X
<i>Inula salicina</i> L.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				X	La cotation correspond à la subsp. <i>salicina</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	63		VU	X	X	
<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63					X
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	63					
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	I	8	99,32	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 43 ; 63					
<i>Leontodon crispus</i> Vill.	I	1	99,92	E	CR	D	15					
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	I	7	99,41	RR	CR	D	15 ; 43					X
<i>Lindernia palustris</i> Hartmann	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 63		VU	X	X	
<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz	I?	0	100,00	D?	CR*							Indigénat à confirmer en Auvergne
<i>Lolium temulentum</i> L.	I	3	99,75	E	CR*				EN		X	Quelques mentions anciennes se rapportent à la subsp. <i>linicolum</i> (= <i>L. remotum</i>), certainement accidentelle en Auvergne, la cotation concerne donc uniquement la sous-espèce indigène (subsp. <i>temulentum</i>) qui ne semble pas avoir été revue récemment
<i>Lolium temulentum</i> L. subsp. <i>temulentum</i>	I	3	99,75	E	CR*				EN		X	Apparemmement non revu récemment
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	I?	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X	X	La cotation correspond à la subsp. <i>reticulatus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Lythrum thymifolium</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63		NT	X	X	
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	I	8	99,32	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 63		NT	X	X	
<i>Minuartia recurva</i> (All.) Schinz & Thell.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	15					La cotation correspond à la subsp. <i>condensata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Myosurus minimus</i> L.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63				X	
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63					
<i>Najas minor</i> All.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03				X	
<i>Neslia apiculata</i> Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	43 ; 63				X	
<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	63				X	
<i>Ophrys lutea</i> Cav.	I	1	99,92	E	CR	D	15				X	La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC.	I	2	99,83	E	CR	D	43			X	X	
<i>Orchis simia</i> Lam.	I	8	99,32	RR	CR	D	15 ; 63			X	X	
<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43					
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	15 ; 63					
<i>Pinguicula lusitanica</i> L.	I	1	99,92	E	CR*					X	X	Apparemment non revu récemment
<i>Pisum sativum</i> L.	I	60	94,92	AR	CR*							Presque toutes les mentions se rapportent à des individus cultivés (subsp. <i>sativum</i>), la cotation concerne donc uniquement la sous-espèce indigène (subsp. <i>biflorum</i>) qui n'a pas été revue récemment
<i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>biflorum</i> (Raf.) Soldano	I	0	100,00	D?	CR*							
<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	I	1	99,92	E	CR*							Indigénat à confirmer en Auvergne (pour les mentions récentes). Non revu depuis les années 1970 dans les stations où il semblait indigène
<i>Polycnemum arvense</i> L.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	15 ; 43 ; 63		EN		X	
<i>Polycnemum majus</i> A.Braun	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 15 ; 43 ; 63				X	
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63					
<i>Potamogeton lucens</i> L.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63					
<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W.D.J.Koch	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03					
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	63		EN	X	X	
<i>Radiola linoides</i> Roth	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63					
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	43		EN	X	X	
<i>Ranunculus lingua</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43			X	X	
<i>Ranunculus parviflorus</i> L.	I?	1	99,92	E	CR	D	63					
<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter	I	1	99,92	E	CR	D	15				X	
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63			X	X	
<i>Rumex palustris</i> Sm.	I	2	99,83	E	CR	D	03					
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X	X	
<i>Salix herbacea</i> L.	I	1	99,92	E	CR	D	63			X	X	
<i>Samolus valerandi</i> L.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				X	
<i>Saxifraga hieraciifolia</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	I	3	99,75	E	CR	D	15		CR	X	X	
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	03 ; 63				X	
<i>Sclerochloa dura</i> (L.) P.Beauv.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	63				X	
<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq.	I	1	99,92	E	CR*						X	Apparemment non revu récemment
<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.Lopez	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03					La cotation correspond à la subsp. <i>purpurascens</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15		VU	X	X	
<i>Stipa eriocaulis</i> Borbás	I	0	100,00	D?	CR*						X	La cotation correspond à la subsp. <i>lutetiana</i> , seule sous-espèce citée en Auvergne
<i>Teucrium montanum</i> L.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	63				X	
<i>Teucrium scordium</i> L.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03				X	La cotation correspond à la subsp. <i>scordium</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Thalictrum flavum</i> L.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>flavum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 43					
<i>Trifolium maritimum</i> Huds.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63				X	La cotation correspond à la subsp. <i>maritimum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	43 ; 63				X	
<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	I	1	99,92	E	CR*					VU	X	Apparemment non revu récemment
<i>Veronica alpina</i> L.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	15				X	
<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	63				X	
<i>Vicia articulata</i> Hornem.	I?	1	99,92	E	CR*						X	Indigénat à confirmer en Auvergne. Apparemment non revu récemment
<i>Viola lactea</i> Sm.	I	2	99,83	E	CR	D	03 ; 63					
<i>Xanthium strumarium</i> L.	I	1	99,92	E	CR*							Apparemment non revu récemment
<i>Adonis aestivalis</i> L.	I	37	96,86	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15				X	La cotation correspond à la subsp. <i>aestivalis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Adonis annua</i> L.	I	35	97.03	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43		X			La cotation correspond à la var. <i>annua</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Adonis flammea</i> Jacq.	I	27	97.71	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63		X			
<i>Aegilops triuncialis</i> L.	I	10	99.15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X			
<i>Allium ericetorum</i> Thore	I	2	99.83	E	EN	B2ab(iii)	15		X			
<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	35	97.03	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63		X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>coriophora</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	20	98.31	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63			X		
<i>Anchusa italica</i> Retz.	I	22	98.14	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43					
<i>Anthemis saxatilis</i> DC. ex Willd.	I	24	97.97	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63					La cotation correspond à la var. <i>saxatilis</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Artemisia alba</i> Turra	I	5	99.58	E	EN	B2ab(iii)	43 ; 63			X		
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. var. <i>silesiacum</i> (Milde) Milde	I	3	99.75	E	EN	D	43					
<i>Asplenium foreziense</i> O.Le Grand	I	36	96.95	R	EN	B2ab(i, ii, iv)	03 ; 63		X	X		
<i>Asplenium obovatum</i> Viv.	I	5	99.58	E	EN	D	15			X		La cotation correspond à la subsp. <i>billotii</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Aster amellus</i> L.	I	13	98.90	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63		X	X		
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	I	12	98.98	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X		
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	I	13	98.90	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63					
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	I	16	98.64	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63					
<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv.	I	2	99.83	E	EN	B2ab(iii)	15					
<i>Bufonia paniculata</i> Dubois ex Delarbre	I	14	98.81	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X	X		
<i>Buglossoides purpureoerulea</i> (L.) I.M.Johnst.	I	23	98.05	R	EN	B2ab(i, ii, iv)	03 ; 15 ; 43					
<i>Bupleurum gerardii</i> All.	I	1	99.92	E	EN	D	03		NT	X		
<i>Bupleurum longifolium</i> L.	I	6	99.49	RR	EN	B2ab(i, ii, iv)	15 ; 63			X		
<i>Bupleurum praealtum</i> L.	I	2	99.83	E	EN	D	15			X		
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	I	40	96.61	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03			X		
<i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koeler	I	3	99.75	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 43		EN	X		
<i>Calendula arvensis</i> L.	I	33	97.20	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43					La cotation correspond à la subsp. <i>arvensis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall	I	5	99.58	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 63					
<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	I	38	96.78	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63					
<i>Carex atrata</i> L.	I	5	99.58	E	EN	D	15			X		La cotation correspond à la var. <i>aterrima</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Carex dioica</i> L.	I	3	99.75	E	EN	B2ab(iii) D	15 ; 43			X		
<i>Carex hartmanii</i> Cajander	I	2	99.83	E	EN	D	43		DD	X		
<i>Carex hostiana</i> DC.	I	3	99.75	E	EN	B2ab(iii)	15					
<i>Carex humilis</i> Leyss.	I	2	99.83	E	EN	B2ab(iii)	03 ; 63			X		
<i>Carlina Biebersteinii</i> Bernh. ex Hornem.	I	4	99.66	E	EN	D	15 ; 63		VU	X	X	
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce	I	37	96.86	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>pulchellum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Duf.	I	3	99.75	E	EN	D	15 ; 43					
<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.	I	1	99.92	E	EN	D	63					
<i>Cistus umbellatus</i> L.	I	3	99.75	E	EN	B2ab(iii, iv) D	43 ; 63		X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>umbellatus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	I	19	98.39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X		
<i>Cornus mas</i> L.	I	15	98.73	RR	EN	D	15					
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch	I	4	99.66	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 63					
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	I	31	97.37	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63			X		
<i>Crucianella angustifolia</i> L.	I	30	97.46	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63					
<i>Cruciata pedemontana</i> (Bellardi) Ehrend.	I	3	99.75	E	EN	D	43			X		
<i>Cyperus longus</i> L.	I	2	99.83	E	EN	B2ab(iii)	15					
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	I	36	96.95	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	63		X	X		
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	I	34	97.12	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43			X		La cotation correspond à la subsp. <i>incarnata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult.	I	6	99.49	RR	EN	CR (D) (-1)	03 ; 15					
<i>Dianthus barbatus</i> L.	I	23	98.05	R	EN	D	63		X	X		Pour partie indigène en Auvergne (subsp. <i>girardinii</i>). La cotation concerne donc uniquement cette sous-espèce, apparemment de faible valeur taxonomique et non reconnue
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub	I	7	99.41	RR	EN	D	15 ; 43 ; 63		X	X		
<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub	I	3	99.75	E	EN	B2ab(iii) D	15		VU	X	X	
<i>Draba aizoides</i> L.	I	2	99.83	E	EN	D	15			X		
<i>Drosera intermedia</i> Hayne	I	21	98.22	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63		X	X		
<i>Dryas octopetala</i> L.	I	3	99.75	E	EN	D	15 ; 63		X	X		
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	I	32	97.29	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X	X		

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv.	I	22	98,14	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63					
<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	I	2	99,83	E	EN	D	03 ; 63			X		
<i>Ephedra major</i> Host	I?	2	99,83	E	EN	D	43				X	
<i>Epilobium nutans</i> F.W.Schmidt	I	12	98,98	RR	EN	D	15 ; 63					
<i>Epipactis exilis</i> (Baumann & Baumann) Delforge	I	2	99,83	E	EN	D	63					
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	I	12	98,98	RR	EN	D	03 ; 15 ; 63				X	
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	I	36	96,95	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63				X	
<i>Epipactis rhodanensis</i> Gevaudan & Robatsch	I	6	99,49	RR	EN	D	03 ; 63				X	
<i>Erigeron alpinus</i> L.	I	6	99,49	RR	EN	D	15 ; 63		X	X		
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	I	17	98,56	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63					
<i>Euphorbia loreyi</i> Jord.	I	1	99,92	E	EN	D	03					
<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck	I	3	99,75	E	EN	D	15 ; 43 ; 63					
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	I	28	97,63	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43					Taxon représenté en Auvergne par deux sous-espèces, la subsp. <i>vaillantii</i> (menacée) et la subsp. <i>schleicheri</i> (non indigène). La cotation concerne donc uniquement la subsp. <i>vaillantii</i>
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel. subsp. <i>vaillantii</i>	I	28	97,63	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43					
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	I	9	99,24	RR	EN	D	43 ; 63		X	X		
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	I	26	97,80	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	63				X	
<i>Genista germanica</i> L.	I	8	99,32	RR	EN	D	43 ; 63				X	
<i>Gentiana cruciata</i> L.	I	22	98,14	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill.	I	9	99,24	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63		X	X		
<i>Hieracium umbrosus</i> Jord.	I	4	99,66	E	EN	D	15 ; 63					
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63					
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	I	8	99,32	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63					
<i>Hypericum desetangii</i> Lamotte	I?	4	99,66	E	EN	D	03 ; 63		X	X		Espèce hybridogène
<i>Hypericum richeri</i> Vill.	I	2	99,83	E	EN	D	43		X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>richeri</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	I	32	97,29	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43					
<i>Inula spiraeifolia</i> L.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	63				X	
<i>Jacobaea leucophylla</i> (DC.) Pelser	I	1	99,92	E	EN	D	43		LC	X	X	
<i>Jasione crispa</i> (Pourr.) Samp.	I	1	99,92	E	EN	B2ab(iii)	63	Endémique Massif central	EN	X	X	La cotation correspond à la subsp. <i>arvensis</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	I	22	98,14	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63					
<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f.	I	39	96,69	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63					
<i>Lactuca saligna</i> L.	I	8	99,32	RR	EN	D	15 ; 43 ; 63					
<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	15 ; 43 ; 63					
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63				X	
<i>Lemna trisulca</i> L.	I	18	98,47	R	EN	B2ab(i,ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Leucoujum vernum</i> L.	I	3	99,75	E	EN	D	43				X	
<i>Limosella aquatica</i> L.	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				X	
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	I	27	97,71	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				X	
<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz.	I	28	97,63	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>supina</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Linum tenuifolium</i> L.	I	34	97,12	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43					
<i>Linum trigynum</i> L.	I	6	99,49	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43				X	
<i>Lobelia urens</i> L.	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03				X	
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	I	17	98,56	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		NT	X	X	
<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb.	I	15	98,73	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63					
<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rohb.	I	3	99,75	E	EN	D	63				X	
<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz & Thell.	I	5	99,58	E	EN	D	43 ; 63		DD			
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	I?	9	99,24	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				X	Indigénat à confirmer en Auvergne
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	I	26	97,80	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	I	16	98,64	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63					
<i>Ononis pusilla</i> L.	I	14	98,81	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63		X	X		
<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch.	I	12	98,98	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X	X		

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Orchis militaris</i> L.	I	30	97,46	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 15 ; 43 ; 63		X	X		
<i>Orobanche artemisi-campestris</i> Vaucher ex Gaudin	I	2	99,83	E	EN	D	43 ; 63		DD		X	
<i>Orobanche flava</i> Mart. ex F.W.Schultz	I	5	99,58	E	EN	D	15 ; 63		DD		X	
<i>Osmunda regalis</i> L.	I	25	97,88	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)					X	
<i>Papaver hybridum</i> L.	I	5	99,58	E	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 43 ; 63					
<i>Paragymnopteris marantae</i> (L.) K.H.Shing	I	3	99,75	E	EN	D	15 ; 43		X	X		
<i>Paronychia polygonifolia</i> (Willd.) DC.	I	3	99,75	E	EN	D	15 ; 43				X	
<i>Persicaria vivipara</i> (L.) Ronse Decr.	I	3	99,75	E	EN	D	63				X	
<i>Peucedanum officinale</i> L.	I?	1	99,92	E	EN	D	15			X		La cotation correspond à la var. <i>officinale</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Phelipanche inexpectata</i> Carlón, G.Gómez, M.Laínz, Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew.	I	2	99,83	E	EN	D	63					
<i>Phelipanche ramosa</i> (L.) Pomel	I	1	99,92	E	EN	D	43					
<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	I	8	99,32	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63				X	
<i>Ptilularia globulifera</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63		X	X		
<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcang.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	15			X	X	
<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	I	27	97,71	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43					La cotation correspond à la subsp. <i>comosa</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Polypodium cambricum</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D	15 ; 63				X	
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	03 ; 63				X	
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63					
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	I	3	99,75	E	EN	B2ab(iii)	03 ; 15 ; 63					
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	I	5	99,58	E	EN	D	43 ; 63			X		La cotation correspond à la var. <i>rotundifolia</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Ranunculus paludosus</i> Poir.	I	16	98,64	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63			X		
<i>Rhamnus alpina</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	D	15 ; 43			X		
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	I	29	97,54	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63					
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	I	3	99,75	E	EN	CR (D) (-1)	03					
<i>Rumex maritimus</i> L.	I	29	97,54	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63					
<i>Salix hastata</i> L.	I	3	99,75	E	EN	D	15				X	
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X	X		
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	I	2	99,83	E	EN	D	03 ; 63				X	
<i>Schoenus nigricans</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D	15				X	
<i>Serapias lingua</i> L.	I	38	96,78	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43				X	
<i>Seseli annuum</i> L.	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63			X		La cotation correspond à la subsp. <i>annuum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Silene gallica</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63					
<i>Sison segetum</i> L.	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63				X	
<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	I	8	99,32	RR	EN	D	15 ; 43 ; 63					
<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G.Don	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Spiraea hypericifolia</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D	15					Une partie des données se rapporte à des plantes cultivées (subsp. <i>hypericifolia</i>), la cotation concerne donc uniquement la sous-espèce indigène (subsp. <i>obovata</i>)
<i>Spiraea hypericifolia</i> L. subsp. <i>obovata</i> (Willd.) H.Huber	I	1	99,92	E	EN	D	15	Endémique franco-ibérique				
<i>Stachys heraclea</i> All.	I	1	99,92	E	EN	D	63		X	X		
<i>Staezelina dubia</i> L.	I	1	99,92	E	EN	D	15				X	
<i>Swertia perennis</i> L.	I	5	99,58	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 63		X	X		
<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth	I	16	98,64	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X		La cotation correspond à la var. <i>maritimus</i> , seule variété citée en Auvergne
<i>Thalictrum simplex</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D	15					
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	I	4	99,66	E	EN	B2ab(iii)	03 ; 15				X	
<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Rchb.f.	I	4	99,66	E	EN	D	15 ; 43					
<i>Tozzia alpina</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D	15		X	X		
<i>Tragopogon crocifolius</i> L.	I	8	99,32	RR	EN	B2ab(i,ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	I	10	99,15	RR	EN	D	15 ; 63				X	
<i>Trifolium badium</i> Schreb.	I	12	98,98	RR	EN	D	15 ; 43 ; 63					
<i>Trifolium ornithopodioides</i> L.	I	4	99,66	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Triglochin maritimum</i> L.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	63		X	X		

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Utricularia minor</i> L.	I	12	98,98	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Veronica acinifolia</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63				X	
<i>Veronica spicata</i> L.	I	20	98,31	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63			X	X	
<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.	I	6	99,49	RR	EN	D	15 ; 63				X	
<i>Vicia hybrida</i> L.	I?	9	99,24	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	63				X	
<i>Vicia onobrychioides</i> L.	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63					
<i>Viola biflora</i> L.	I	1	99,92	E	EN	D	63				X	
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	I	2	99,83	E	EN	D	15			X	X	
<i>Zannichellia palustris</i> L.	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63					
<i>Aconitum burnatii</i> Gáyer	I	2	99,83	E	VU	D1+2	43				X	
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	I	14	98,81	RR	VU	D2	15 ; 63					
<i>Allium flavum</i> L.	I	11	99,07	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63			X	X	
<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	I?	7	99,41	RR	VU	D2	63				X	
<i>Althaea cannabina</i> L.	I	11	99,07	RR	VU	D2	63				X	
<i>Anogramma leptophyllum</i> (L.) Link	I	6	99,49	RR	VU	D2	03 ; 15				X	
<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	I	16	98,64	RR	VU	D2	15					
<i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl.	I	7	99,41	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63					
<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	I	14	98,81	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 63					X
<i>Asarina procumbens</i> Mill.	I	11	99,07	RR	VU	D1	15	Endémique franco-ibérique		X	X	
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>pachyrachis</i> (H.Christ) Lovis & Reichst.	I	7	99,41	RR	VU	D1	03 ; 43 ; 63				X	
<i>Asplenium viride</i> Huds.	I	11	99,07	RR	VU	D1	15 ; 63			X	X	
<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	I	10	99,15	RR	VU	D2	63				X	
<i>Atropa belladonna</i> L.	I	11	99,07	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Betula nana</i> L.	I	6	99,49	RR	VU	D1	43		NT	X	X	
<i>Bidens radiata</i> Thuill.	I	16	98,64	RR	VU	D2	03 ; 43 ; 63				X	
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla subsp. <i>maritimus</i>	I	8	99,49	RR	VU	D2	03 ; 43 ; 63				X	
<i>Bupleurum baldense</i> Turra	I	13	98,90	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Callitriche palustris</i> L.	I	14	98,81	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Campanula rhomboidalis</i> L.	I	13	98,90	RR	VU	D2	43 ; 63	Endémique ouest-alpine		X	X	
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	I	14	98,81	RR	VU	D1	03 ; 63				X	
<i>Carex ericetorum</i> Pollich	I	14	98,81	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Carex montana</i> L.	I	6	99,49	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Carex pilosa</i> Scop.	I	14	98,81	RR	VU	D2	15 ; 63				X	
<i>Carex vulpina</i> L.	I	18	98,47	R	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63				X	
<i>Carthamus mitissimus</i> L.	I	3	99,75	E	VU	B2ab(iii) D2	03 ; 15	Endémique franco-ibérique		X	X	
<i>Cerastium ramosissimum</i> Boiss.	I	10	99,15	RR	VU	D1	15 ; 43		LC		X	
<i>Cicuta virosa</i> L.	I	12	98,98	RR	VU	D2	15 ; 63			X	X	
<i>Cistus salvifolius</i> L.	I	5	99,58	E	VU	EN (D) (-1)	15				X	
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	I	4	99,66	E	VU	D2	63					
<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	I	13	98,90	RR	VU	D1	63			X	X	
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	I	12	98,98	RR	VU	D2	43 ; 63					
<i>Cystopteris dickiana</i> R.Sim	I	13	98,90	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	I	27	97,71	R	VU	D1	63			X		Taxon représenté en Auvergne par la subsp. <i>fuchsii</i> (menacée) et le subsp. <i>psychrophila</i> (méconnue et de faible valeur taxonomique)
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i>	I	27	97,71	R	VU	D1	63				X	
<i>Dianthus superbus</i> L.	I	23	98,05	R	VU	D1	03 ; 15 ; 43			X	X	
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	I	11	99,07	RR	VU	D2	15 ; 63				X	
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	I	18	98,47	R	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Empetrum nigrum</i> L.	I	12	98,98	RR	VU	D1	03 ; 15 ; 43 ; 63				X	Taxon représenté en Auvergne par les subsp. <i>nigrum</i> et <i>hermaphroditum</i> , toutes deux menacées

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Böcher	I	6	99,49	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63		X	X		
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	I?	2	99,83	E	VU	D1	63			X		La cotation correspond à la subsp. <i>dodonaei</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	I	19	98,39	R	VU	D1	03 ; 15 ; 43 ; 63		X	X		
<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	I	12	98,98	RR	VU	D2	15 ; 63		X	X		
<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth	I	7	99,41	RR	VU	B2ab(iii) D1+2	43 ; 63		X	X		
<i>Euphorbia angulata</i> Jacq.	I	11	99,07	RR	VU	D2	03 ; 15					
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	I	10	99,15	RR	VU	D1	03 ; 63		X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>angustifolia</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne (la subsp. <i>oxycarpa</i> serait citée par erreur)
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	I	10	99,15	RR	VU	D2	15		X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>meleagris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Galium parisiense</i> L. subsp. <i>divaricatum</i> (Pourr. ex Lam.) Rouy	I	6	99,49	RR	VU	D1	03 ; 15 ; 43					
<i>Gasparinia peucedanoides</i> (M.Bieb.) Thell.	I	19	98,39	R	VU	D1	43 ; 63			X		
<i>Gnaphalium norvegicum</i> Gunnerus	I	10	99,15	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Gnaphalium supinum</i> L.	I	2	99,83	E	VU	D1	63				X	
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	I	14	98,81	RR	VU	D1	15 ; 63		X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>aurantiacum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Hieracium cantalicum</i> Arv.-Touv.	I	2	99,83	E	VU	D1	15 ; 63				X	
<i>Hieracium cymosum</i> L.	I	4	99,66	E	VU	D1+2	15		X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>cymosum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat subsp. <i>peleterianum</i>	I	6	99,49	RR	VU	D1	15 ; 63				X	
<i>Hieracium vogesiacum</i> (Kirschl.) Moug. ex Fr.	I	9	99,24	RR	VU	D1	15 ; 63				X	
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	I	10	99,15	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Homungia petraea</i> (L.) Rchb.	I	6	99,49	RR	VU	D1	15 ; 63					
<i>Iberis amara</i> L.	I	14	98,81	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 63					
<i>Isoetes lacustris</i> L.	I	8	99,32	RR	VU	B2ab(iii) D2	43 ; 63		LC	X	X	
<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	9	99,24	RR	VU	D2	03 ; 43					
<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	I	13	98,90	RR	VU	D2	43 ; 63			X	X	
<i>Lathyrus angulatus</i> L.	I	16	98,64	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63					
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	I	15	98,73	RR	VU	D2	15				X	
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	I?	10	99,15	RR	VU	D2	43 ; 63				X	
<i>Lepidium latifolium</i> L.	I	2	99,83	E	VU	D2	63				X	
<i>Linum austriacum</i> L.	I	11	99,07	RR	VU	D2	03 ; 63		X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>collinum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Lonicera alpigena</i> L.	I	22	98,14	R	VU	D1	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	I	10	99,15	RR	VU	D1+2	15 ; 43 ; 63			X	X	
<i>Lysimachia maritima</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano	I	9	99,24	RR	VU	D2	63			X	X	
<i>Lysimachia thyrsoflora</i> L.	I	10	99,15	RR	VU	D2	15 ; 43		NT	X	X	
<i>Melampyrum vaudense</i> (Ronniger) Soó	I	12	98,98	RR	VU	D2					X	
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>hybrida</i>	I	3	99,75	E	VU	D2	43 ; 63					
<i>Moehringia muscosa</i> L.	I	13	98,90	RR	VU	D2					X	
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A.Gray	I	15	98,73	RR	VU	D1+2	15 ; 63				X	
<i>Odonites luteus</i> (L.) Clairv.	I	1	99,92	E	VU	D2	15					La cotation correspond à la subsp. <i>luteus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	I	5	99,58	E	VU	D2	15 ; 63					
<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit. ex Willd.) DC.	I	22	98,14	R	VU	D2	15 ; 43				X	
<i>Ononis natrix</i> L.	I	4	99,66	E	VU	D2	15 ; 43					La cotation correspond à la subsp. <i>natrix</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Orchis pallens</i> L.	I	2	99,83	E	VU	D1	15		X	X		
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	I	7	99,41	RR	VU	D2	15 ; 43					
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	I	15	98,73	RR	VU	D2	15 ; 63					
<i>Orobanche hederæ</i> Duby	I	17	98,56	RR	VU	D1	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	I	13	98,90	RR	VU	D1+2	03 ; 15 ; 43 ; 63				X	
<i>Paradisea liliastrum</i> (L.) Bertol.	I	2	99,83	E	VU	D2	15 ; 43			X	X	
<i>Parietaria officinalis</i> L.	I	18	98,47	R	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Pedicularis verticillata</i> L.	I	4	99,66	E	VU	D1	15		X	X		
<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják	I	10	99,15	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Pinguicula grandiflora</i> Lam.	I	9	99,24	RR	VU	D1+2	43 ; 63		X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>grandiflora</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Plantago maritima</i> L.	I	9	99,24	RR	VU	D2	15 ; 63		X	X		Taxon représenté en Auvergne par les subsp. <i>maritima</i> et subsp. <i>serpentina</i> , toutes deux menacées
<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	I	3	99,75	E	VU	D2	63		X	X		
<i>Polemonium caeruleum</i> L.	I?	14	98,81	RR	VU	D2	15 ; 43		X	X		
<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz	I	13	98,90	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	I	15	98,73	RR	VU	D1	03 ; 15 ; 43 ; 63				X	
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	I	15	98,73	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Potamogeton pusillus</i> L.	I	7	99,41	RR	VU	D2	03 ; 15					
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schltr.	I	5	99,58	E	VU	D2	03 ; 63					
<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Beck ex Fritsch	I	7	99,41	RR	VU	D1	15 ; 43				X	La cotation correspond à la subsp. <i>crantzii</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Potentilla supina</i> L.	I	8	99,32	RR	VU	B2ab(iii)	03				X	
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	I	13	98,90	RR	VU	D1+2	63				X	
<i>Ranunculus montanellus</i> L.	I	4	99,66	E	VU	B2ab(iii)	43				X	
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	I	5	99,58	E	VU	B2ab(iii)	15 ; 43 ; 63		NT	X	X	
<i>Rorippa aspera</i> (L.) Maire	I	11	99,07	RR	VU	D1+2	03 ; 15 ; 43 ; 63				X	La cotation correspond à la subsp. <i>aspera</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Rosa gallica</i> L.	I?	8	99,32	RR	VU	D2	03 ; 63			X	X	
<i>Rumex scutatus</i> L.	I	9	99,24	RR	VU	D1	15 ; 63				X	
<i>Sagina saginoides</i> (L.) H.Karst.	I	10	99,15	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63					
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	I	6	99,49	RR	VU	EN (D) (-1)	15 ; 43					La cotation correspond à la subsp. <i>angustifolia</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Salvia aethiops</i> L.	I	5	99,58	E	VU	D2	43 ; 63				X	
<i>Saxifraga androsacea</i> L.	I	3	99,75	E	VU	D1	15				X	X
<i>Saxifraga exarata</i> Vill.	I	3	99,75	E	VU	D1	15 ; 63	Endémique Massif central	VU	X	X	La cotation correspond à la subsp. <i>lamottei</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	I	3	99,75	E	VU	D1	15				X	X
<i>Saxifraga pedemontana</i> All.	I	4	99,66	E	VU	D1	15	Endémique Massif central	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>prostii</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Scrophularia alpestris</i> J.Gay ex Benth.	I	8	99,32	RR	VU	D2	15					
<i>Sedum anopetalum</i> DC.	I	4	99,66	E	VU	D2	15					
<i>Silene ciliata</i> Pourr.	I	5	99,58	E	VU	D2	15 ; 63			X	X	
<i>Soldanella alpina</i> L.	I	2	99,83	E	VU	D2	63			X	X	
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	I	13	98,90	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr.	I	22	98,14	R	VU	D1					X	
<i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl	I	8	99,32	RR	VU	D2	43 ; 63			X	X	La cotation correspond à la subsp. <i>media</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	I	6	99,49	RR	VU	D2	63		VU	X	X	
<i>Taraxacum sect. Palustris</i> (Lindb.f.) Dahlst.	I	15	98,73	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63					
<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	I	2	99,83	E	VU	D2	15				X	La cotation correspond à la subsp. <i>umbellata</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	I	7	99,41	RR	VU	D1	15 ; 43				X	X
<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	I	7	99,41	RR	VU	B2ab(iii) D2	03 ; 15 ; 43 ; 63				X	
<i>Trifolium pallescens</i> Schreb.	I	4	99,66	E	VU	D1	15 ; 63			X	X	
<i>Trifolium retusum</i> L.	I	6	99,49	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63		VU		X	
<i>Trifolium strictum</i> L.	I	9	99,24	RR	VU	D2	03 ; 43 ; 63				X	
<i>Triglochin palustre</i> L.	I	12	98,98	RR	VU	D2	15 ; 63				X	
<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	I?	7	99,41	RR	VU	D2	43 ; 63			X	X	
<i>Verbascum boerhavii</i> L.	I	12	98,98	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63					
<i>Veronica praecox</i> All.	I	15	98,73	RR	VU	D2	03 ; 43 ; 63					
<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	I	6	99,49	RR	VU	D2	15				X	
<i>Vicia melanops</i> Sm.	I?	15	98,73	RR	VU	D2			LC	X		Indigénat à confirmer en Auvergne
<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.	I	7	99,41	RR	VU	D2	15					
<i>Vulpia unilaterialis</i> (L.) Stace	I	12	98,98	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43					
<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	I	13	98,90	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay	I	5	99,58	E	NT	pr. B2a D2	15				X	La cotation correspond à la subsp. <i>lainzii</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Agrostemma githago</i> L.	I	89	92,46	PC	NT	pr. B2b(iii)	03				X	

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet	I	168	85,76	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)			X	X		
<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f.	I	26	97,80	R	NT	pr. B2b(iii) D2	03 ; 43					La cotation correspond à la subsp. <i>linosyris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Galium boreale</i> L.	I	12	98,98	RR	NT	pr. B2b(iii) D2	15 ; 43				X	
<i>Galium glaucum</i> L.	I	23	98,05	R	NT	pr. B2b(iii) D2	03 ; 43					
<i>Gentiana verna</i> L.	I	22	98,14	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	63				X	
<i>Gentianella campestris</i> (L.) Borner	I	104	91,19	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03					La cotation correspond à la subsp. <i>campestris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Geum montanum</i> L.	I	10	99,15	RR	NT	pr. D2	15 ; 63				X	
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	I	41	96,53	R	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 63				X	
<i>Gymnadenia nigra</i> (L.) Rchb.f.	I	18	98,47	R	NT	pr. D1+2	15 ; 43 ; 63		X	X		La cotation correspond à la subsp. <i>austriaca</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat subsp. <i>ligericum</i> Zahn	I	14	98,81	RR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43 ; 63		X	X		
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	I	30	97,46	R	NT	pr. D2	03 ; 15 ; 63					
<i>Hypericum elodes</i> L.	I	63	94,66	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)						
<i>Inula montana</i> L.	I	30	97,46	R	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 43				X	
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	I	69	94,15	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03					
<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	I	18	98,47	R	NT	pr. B2b(iii) D2	15 ; 43		LC	X	X	
<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br.	I	30	97,46	R	NT	pr. B2b(iii)	43			X	X	
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	I	53	95,51	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	15 ; 43			X	X	
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	I	49	95,85	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15					La cotation correspond à la subsp. <i>rigidum</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.)	I	33	97,20	R	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 43 ; 63					
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	I	45	96,19	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 43		NT	X	X	
<i>Luzula luzulina</i> (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.	I	13	98,90	RR	NT	pr. D2	15 ; 43 ; 63			X	X	
<i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schult.	I	21	98,22	R	NT	pr. D1	15 ; 43 ; 63					
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	I	57	95,17	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03				X	
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	I	70	94,07	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63					
<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv.	I	28	97,63	R	NT	pr. D1	03 ; 43			X	X	
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	I	31	97,37	R	NT	pr. D2	03 ; 15					
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	I	58	95,08	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 43					
<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.	I	32	97,29	R	NT	pr. B2b(iii)	43 ; 63				X	
<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern	I	8	99,32	RR	NT	pr. B2b(i, ii) D2	15 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>verna</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Moenchia erecta</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	I	64	94,58	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 63					La cotation correspond à la var. <i>erecta</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Najas marina</i> L.	I	19	98,39	R	NT	pr. D2	63				X	
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	I	52	95,59	AR	NT	pr. B2b(iii)	43 ; 63					
<i>Onobrychis supina</i> (Chaix) DC.	I	21	98,22	R	NT	pr. D2					X	
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	I	59	95,00	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03					
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench	I	35	97,03	R	NT	pr. D1	03 ; 15 ; 43					La cotation correspond à la subsp. <i>fuciflora</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Ophrys insectifera</i> L.	I	41	96,53	R	NT	pr. D1	03 ; 15		X	X		
<i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus	I	24	97,97	R	NT	pr. D1	03 ; 15 ; 43			X	X	
<i>Ophrys scolopax</i> Cav.	I	44	96,27	AR	NT	pr. D1	03 ; 15 ; 43			X	X	
<i>Pedicularis palustris</i> L.	I	89	92,46	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03					
<i>Plantago holostium</i> Scop.	I	18	98,47	R	NT	pr. D2	63				X	La cotation correspond à la var. <i>holostium</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	I	14	98,81	RR	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	03 ; 63					
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	I	108	90,85	PC	NT	pr. B2b(iii)	43		X	X		
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre subsp. <i>alba</i> Zamelis	I	7	99,41	RR	NT	pr. D2	63				X	
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	I	12	98,98	RR	NT	pr. D2	15 ; 43			X	X	
<i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten.	I	40	96,61	R	NT	pr. B2b(iii)					X	
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	I	21	98,22	R	NT	pr. D2	03 ; 15 ; 43 ; 63					La cotation correspond à la subsp. <i>trichophyllus</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Saxifraga bryoides</i> L.	I	4	99,66	E	NT	pr. D1	15 ; 63		X	X		
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	I	54	95,42	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 15					La cotation correspond à la subsp. <i>pecten-veneris</i> , seule sous-espèce présente en Auvergne
<i>Sedum sexangulare</i> L.	I	36	96,95	R	NT	pr. B2b(iii)	63					
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	I	14	98,81	RR	NT	pr. D2	03 ; 15 ; 63					
<i>Senecio lividus</i> L.	I	19	98,39	R	NT	pr. D1+2	15 ; 43 ; 63				X	
<i>Sesamoides pygmaea</i> (Scheele) Kuntze	I	6	99,49	RR	NT	pr. D2	15 ; 63		X	X		La cotation correspond à la var. <i>sesamoides</i> , seule variété présente en Auvergne
<i>Seseli montanum</i> L.	I	45	96,19	AR	NT	pr. B2b(iii)	15					
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	I	60	94,92	AR	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 43					
<i>Silene noctiflora</i> L.	I?	14	98,81	RR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43 ; 63			X		Indigénat à confirmer en Auvergne

Nom valide du taxon (TAXREF5)	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles 5 x 5 km de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Citation dans le livre rouge national	Protection réglementaire	Citation dans la liste rouge Auvergne (2004)	Remarques
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel	I	43	96,36	AR	NT	pr. B2b(iii)						
<i>Silene saxifraga</i> L.	I	21	98,22	R	NT	pr. D1+2						
<i>Sison amomum</i> L.	I	24	97,97	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	15 ; 63					
<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	I	79	93,31	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)						
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	I	56	95,25	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iv) D1	03					
<i>Stachys germanica</i> L.	I	45	96,19	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43					
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	I	31	98,14	R	NT	pr. B2b(i, ii)	03 ; 15 ; 43 ; 63					
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	I	38	96,78	R	NT	pr. D1	15					
<i>Thesium humifusum</i> DC.	I	75	93,73	AR	NT	pr. B2b(iii)	15		X			La cotation concerne la sous-espèce <i>humifusum</i> ; la sous-espèce <i>divaricatum</i> , quant à elle, est méconnue (cotation DD). Seule cette dernière sous-espèce était citée dans la liste rouge régionale précédente
<i>Thesium humifusum</i> DC. subsp. <i>humifusum</i>	I	70	94,07	AR	NT	pr. B2b(iii)	15					
<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm.	I	27	97,71	R	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 63			X		
<i>Trapa natans</i> L.	I	18	98,47	R	NT	pr. B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63			X		
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	I	40	96,61	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63			X		
<i>Tulipa sylvestris</i> L.	I	19	98,39	R	NT	pr. D2	15 ; 43 ; 63			X		Les deux sous-espèces de <i>Tulipa sylvestris</i> présentes en Auvergne (subsp. <i>australis</i> et subsp. <i>sylvestris</i>) sont toutes deux menacées
<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.	I	12	98,98	RR	NT	pr. D2	15 ; 43			X		
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	I	79	93,31	AR	NT	pr. D1	15 ; 43		X	X		
<i>Utricularia australis</i> R.Br.	I	43	96,36	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63			X		
<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	I	36	96,95	R	NT	pr. B2(iii)	03 ; 15 ; 43		X	X		
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	I	57	95,17	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43		X	X		
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	I	55	95,34	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 63					
<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) Kunkel	I	2	99,83	E	NT	pr. B2a D2	15		LC	X		
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.	I	46	96,10	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)				X		
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	I	50	95,76	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	43					
<i>Veronica austriaca</i> L.	I	52	95,59	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 15 ; 63					
<i>Vicia narbonensis</i> L.	I	43	96,36	AR	NT	pr. D2	43			X		
<i>Vicia serratifolia</i> Jacq.	I	37	96,86	R	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43			X		
<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm.	I	36	96,95	R	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 43			X		