

**Schedonoro arundinaceae-Puccinellietum distantis**

Billy ex Thébaud, C. Roux, C.-E. Bernard & Delcoigne 2014 *nom. corr.* (art. 44)

	222807	222808	222809	222810	222812	222813	385903	385921	SYNTHESE
<b>Numéro relevé</b>									
<b>Altitude (m)</b>	920	550	570	700	950	550	940	550	<b>759</b>
<b>Pente relevé (°)</b>	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	<b>nd</b>
<b>Exposition</b>									
<b>Surface (m<sup>2</sup>)</b>	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	<b>nd</b>
<b>Recouvrement total (%)</b>	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	<b>nd</b>
<b>Nombre de taxons</b>	10	7	6	5	5	7	12	7	<b>7</b>
<b>Combinaison caractéristique</b>									
<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	1	1	1	1,2	2	3	1	2,3	V <sup>1-3</sup>
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	1	1,2	1,2	1,2	1	1,2	1	1,2	V <sup>1</sup>
C <i>Carex distans</i> L.	2	3	1	2	2	1	2	1	V <sup>1-3</sup>
<b>Espèces des milieux humides, moyennement fertiles à fertiles</b>									
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	2	1	4	4	4	3	2	3	V <sup>1-4</sup>
<i>Juncus effusus</i> L.	1	.	1	.	.	.	1	.	II <sup>1</sup>
<i>Poa trivialis</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	I <sup>1</sup>
<b>Espèces à large amplitude</b>									
<i>Plantago lanceolata</i> L.	1	.	.	.	.	.	1	.	II <sup>1</sup>
<i>Trifolium repens</i> L.	1	.	.	.	.	.	1	.	II <sup>1</sup>
<i>Daucus carota</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	I <sup>+</sup>
<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	I <sup>1</sup>
<b>Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles</b>									
<i>Galium verum</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	I <sup>1</sup>
<i>Briza media</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	I <sup>+</sup>
<i>Linum usitatissimum</i> L.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	I <sup>1</sup>
P+ <i>Polygonum aviculare</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	I <sup>1</sup>
<b>Espèces annuelles</b>									
<i>Medicago lupulina</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	I <sup>1</sup>
<b>Genres</b>									
<i>Elytrigia</i> Desv.	.	.	.	.	1	1	.	1	II <sup>1</sup>