

Junco striati-Eleocharitetum palustris Choisnet ass. nov.

		512106	512084	512109	512114	512117	SYNTHESE
Numéro relevé							
Altitude (m)		145	142	145	145	145	144
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition							
Surface (m²)		20	15	7	10	6	12
Recouvrement total (%)		100	70	100	90	90	86
Nombre de taxons		20	12	11	23	17	16
Combinaison caractéristique							
C	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	2,2	+	1,1	1,1	+	V ⁺²
	<i>Teucrium scordium</i> L.	2,2	1,1	+	1,1	2,2	V ⁺²
	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	+	4,4	4,4	.	2,2	IV ⁺⁴
	<i>Junco striatus</i> Schousb. ex E.Mey.	4,4	+	.	2,2	1,1	IV ⁺⁴
	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	1,1	.	+	+	1,1	IV ⁺¹
	<i>Mentha pulegium</i> L.	.	.	.	2,2	3,3	II ²⁻³
	<i>Gratiola officinalis</i> L.	.	1,1	.	.	3,3	II ¹⁻³
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles							
C	<i>Potentilla reptans</i> L.	.	+	.	+	r	III ^{r+}
C	<i>Junco articulatus</i> L.	+	.	+	+	.	III ⁺
	<i>Mentha aquatica</i> L.	.	1,1	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à moyennement fertiles							
	<i>Lotus glaber</i> Mill.	1,1	.	.	+	r	III ^{r-1}
C	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	1,1	.	.	.	i	II ⁱ⁻¹
P++	<i>Carex tomentosa</i> L.	.	.	.	+	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles							
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	3,3	+2	2,2	3,3	3,3	V ⁺³
	<i>Ranunculus repens</i> L.	+	.	3,3	.	.	II ⁺³
	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	.	.	+	.	.	II ⁺
Espèces des milieux frais moyennement fertiles							
C	<i>Carex distans</i> L.	+	.	.	.	i	II ⁱ⁺
	<i>Bromus racemosus</i> L.	.	.	.	+	.	I ⁺
C	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	.	.	.	r	.	I ^r
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles							
Ci	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv.	.	.	.	r	.	I ^r
P	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench	r	I ^r
Espèces à large amplitude							
	<i>Trifolium repens</i> L.	2,2	.	2,2	1,1	2,2	IV ¹⁻²
P+	<i>Plantago major</i> L.	r	.	.	r	i	III ^{i+r}
	<i>Ranunculus acris</i> L.	+	.	.	r	.	II ^{r+}
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	.	.	.	+	.	I ⁺
Autres taxons							
	<i>Teucrium scordium</i> L.	2,2	1,1	+	1,1	2,2	V ⁺²
	<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	+	1,1	2,3	.	3,3	IV ⁺³
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i> (Lindb.f.) Dahlst.	1,1	.	.	2,2	+	III ⁺²
	<i>Galium debile</i> Desv.	+	.	.	+	r	III ^{r-2}
	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	.	.	.	r,2	.	I ^r
	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Peucedanum officinale</i> L.	.	.	.	r	.	I ^r
	<i>Junco compressus</i> Jacq.	1,1	I ¹
Genres							
	<i>Galium</i> L.	.	r	.	.	.	I ^r
	<i>Mentha</i> L.	2,2	I ²
	<i>Amaranthus</i> L.	.	r	.	.	.	I ^r
	<i>Pertusaria</i> sp.	.	+	.	.	.	I ⁺