Anacamptido morionis-Saxifragetum granulatae

Gaume *ex* B. Foucault 1989 *nom. corr.* (art. 44)

		Numéro relevé	338563	382781	382786	388137	650679	571967	573479	598320	598333	598392	640444	650630	584586	573536	584578	598346	650719	382793	382796	572000	572011	572030	598439	598488	598493	SYNTHESE
		Altitude (m)	340	nd	900	690	nd	835	790	157	227	239	223	nd	160	777	140	157	nd	780	800	835	785	740	188	231	228	487
		Pente relevé (°)	5	nd	nd	2	nd	20	30	nd	nd	nd	nd	5	nd	25	nd	nd	10	nd	nd	20	5	40	nd	nd	nd	16
		Exposition	NO			NO		S	S					SE		SE		NE	O			S	SE	NE	O	NE	NE	
		Surface (m²)	100	nd	nd	10	30	20	5	25	25	25	20	10	30	25	30	25	10	nd	nd	25	20	15	40	40	50	28
		Recouvrement total (%)	100	nd	nd	100	100	70	90	98	100	100	100	nd	100	95	100	100	100	nd	nd	90	80	80	100	100	100	95
		Nombre de taxons	43	31	37	45	33	27	17	33	23	46	28	24	33	31	32	29	26	28	31	32	25	25	39	47	49	33
Combinaison caractéristique																													
		Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	1,3	+	+	r,2	1	2,2	.	1	1	+	1	.	.	+	1	+	1,2	1	+	1,1	.	.	+	.	i	IV^{r-2}
		Saxifraga granulata L.	.	+	1	1,1	+	1,1	.	3	2	2	3	2,2	+	.	2	3	+	1	1	1,1	2,2	1,1	3	2	2	V^{+-3}
	F	*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	1,1	.	.	+,2	.	.	.	3	.	1	.	.	+	.	.	2	3,3	.	.	.	.	.	2	2	2	III^{+-3}
		Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.	2,2	.	.	2,2	.	.	+	2	.	.	.	.	+	1,1	2	.	.	.	1	.	.	.	2	2	.	II^{+-2}
		Luzula campestris (L.) DC.	2,2	.	1	1,2	2	1,1	1,1	1	2	2	2	2,2	2	.	2	1	1,2	1	.	1,1	1,1	1,1	2	2	1	V^{1-2}
		Leontodon hispidus L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2,2	.	.	.	+	+	r	+	+	+	1	.	II^{r-2}
		Primula veris L.	+,1	+	+	r,2	.	2,2	.	.	.	.	1	1,1	.	+	.	1	2,3	+	.	1,1	.	.	1	+	1	IV^{r-2}
		Leucanthemum ircutianum DC.	1,1 cf	1 cf	+ cf	+,2 cf	2 cf	1,1 cf	.	1	+	+	.	+ cf	2	+ cf	1	.	2,3 cf	+ cf	+ cf	1,1 cf	1,1 cf	.	+	2	1	V^{+-2}
		Lotus corniculatus L.	1,1	1	+	1,2	+	.	1,1	.	+	1	1	1,1	1	.	2	2	1,2	+	.	+	+	1,1	1	2	2	V^{+-2}
		Pilosella officinarum Vaill.	.	.	.	+,2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	+	.	2	I^{+-2}
		Ajuga reptans L.	1,1	.	+	.	.	.	.	.	.	1	.	+,2	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	II^{+-1}
		Succisa pratensis Moench	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,3	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-3}
		Betonica officinalis L.	2,2	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1	.	2	1,1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II^{+-2}
	R-	*Brachypodium rupestre* (Host) Roem. & Schult.	.	+	.	.	.	.	1,1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-1}
		Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	2,3	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-2}
Espèces des milieux secs, très maigres à maigres																													
		Trifolium striatum L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	I^{2}
		Koeleria gr. *pyramidata*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{1}
		Trifolium ochroleucon Huds.	.	.	.	.	.	.	3,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	I^{+-3}
		Jasione montana L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres																													
		Potentilla erecta (L.) Räusch.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{1}
		Poterium sanguisorba L.	.	+	.	.	.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	3,3	2	.	.	+	.	2,2	.	.	.	.	.	II^{+-3}
	M	*Potentilla fagineicola* Lamotte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
		Silene nutans L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
		Festuca lemanii Bastard	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{1-2}
		Helianthemum nummularium (L.) Mill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{1}
		Thymus gr. *pulegioides*	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-1}
		Pimpinella saxifraga L.	.	.	.	i	.	1,1	.	.	.	+	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	1,1	.	.	+	+	+	II^{i-1}
	Ci	*Galium album* Mill.	1,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{1}
		Rumex acetosella L.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	I^{1}
		Genista sagittalis L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{1}$
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à moyennement fertiles																													
		Myosotis dubia Arrond.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	+	+	+	II^{+-1}
	Ci	*Trifolium incarnatum* L.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	2	.	.	+	.	.	1,1	3,3	.	.	.	II^{+-3}
		Avenula pubescens (Huds.) Dumort.	2,2	+	1	1,2	.	2,2	.	.	.	.	1	.	.	2,2	.	.	.	.	1	3,3	2,2	2,2	.	.	.	III^{+-3}
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles																													
		Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-2}
		Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	+,1	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	i	i	i	II^{i-1}
	C	*Allium vineale* L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	I^{+-1}
	R-	*Clinopodium vulgare* L.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{1}
		Euphorbia cyparissias L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
		Ranunculus bulbosus L.	2,2	1	+	2,2	.	.	1,1	2	2	2	2	.	2	1,1	2	2	1,2	1,2	1	2,2	1,1	2,2	2	2	2	V^{+-2}
		Muscari comosum (L.) Mill.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	I^{+-1}
		Hypericum perforatum L.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	2,2	.	.	+	I^{+-2}
		Carex caryophyllea Latourr.	2,2	.	.	+,2	.	+	.	1	.	.	1	.	2	1,1	1	.	.	.	.	r	2,2	.	1	.	1	III^{r-2}
		Dianthus carthusianorum L.	.	.	.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-1}
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles																													
		Galium verum L.	r	.	.	.	.	2,2	1,1	.	.	.	1	1,2	.	2,2	1	2	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	II^{r-2}
	C	*Malva moschata* L.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	1	.	+	I^{i-1}
		Rhinanthus minor L.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,3	+	1	.	.	.	.	.	.	I^{+-2}
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles																													
		Festuca nigrescens Lam.	.	.	.	.	.	3,3	.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	.	.	3,3	1,1	.	.	.	I^{1-3}
		Nardus stricta L.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{r}$
		Danthonia decumbens (L.) DC.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1,1	.	1,1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-2}
		Briza media L.	2,2	.	.	.	.	1,1	1,1	.	.	.	.	.	1	2,2	.	.	2,3	.	1	1,1	.	.	+	+	2	III^{+-2}
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles																													
		Conopodium majus (Gouan) Loret	.	+	1	+,2	.	+	+	.	.	+	.	.	1	.	.	.	1,2	.	.	+	1,1	1,1	+	1	1	III^{+-1}
		Vicia angustifolia L.	.	.	.	.	.	1,1	+	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	1,1	.	1	+	.	II^{+-1}
		Euphrasia officinalis L.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-1}
	Ci F	*Crepis vesicaria* L.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{2}
		Vicia gr. *sativa*	.	.	1	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	I^{+-2}
		Veronica officinalis L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles																													
		Hieracium umbellatum L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{1}
		Carex flacca Schreb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	^{1}
		Linum usitatissimum L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+}
		Polygala vulgaris L.	1,1	.	.	.	2	.	.	.	.	+	.	.	.	1,1	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-2}
	C	*Filipendula vulgaris* Moench	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{3}
		Ononis spinosa L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	+	1	1	II^{+-2}
		Campanula glomerata L.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{2}
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles																													
	F	*Knautia arvernensis* (Briq.) Szabó	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	I^{1}
		Centaurea jacea L.	1,1	1	.	r	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	+	.	1,1	1,1	.	.	.	.	II^{r-1}
	C F	*Knautia arvensis* (L.) Coult.	.	1	1	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	2,3	+	.	+	.	.	.	.	.	II^{r-2}
		Prunella vulgaris L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
		Centaurea decipiens Thuill.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	2	.	.	.	.	1	2	2,3	.	.	.	.	.	2	1	1	II^{1-2}
		Agrimonia eupatoria L.	r	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{r-2}
		Narcissus poeticus L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{1}
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles																													
		Veronica chamaedrys L.	1,1	1	1	1,2	+	.	.	.	.	+	.	.	1	.	.	.	.	.	+	+	.	1,1	+	1	1	III^{+-1}
		Festuca rubra L.	2,2	.	1	2,2	2	.	.	2	3	2	2	2,2	3	.	3	2	2,3	1,2	.	3,3	.	.	3	3	3	IV^{1-3}
		Stellaria graminea L.	1,1	.	+	.	+	.	.	.	.	1	.	.	1	+	+	1	.	.	.	.	.	.	+	1	+	III^{+-1}
	Ci	*Gaudinia fragilis* (L.) P.Beauv.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	I^{1-2}
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles																													

	Numéro relevé	338563	382781	382786	388137	650679	571967	573479	598320	598333	598392	640444	650630	584586	573536	584578	598346	650719	382793	382796	572000	572011	572030	598439	598488	598493	SYNTHESE
	Altitude (m)	340	nd	900	690	nd	835	790	157	227	239	223	nd	160	777	140	157	nd	780	800	835	785	740	188	231	228	**487**
	Pente relevé (°)	5	nd	nd	2	nd	20	30	nd	nd	nd	nd	5	nd	25	nd	nd	10	nd	nd	20	5	40	nd	nd	nd	**16**
	Exposition	NO			NO		S	S					SE		SE		NE	O			S	SE	NE	O	NE	NE	
	Surface (m²)	100	nd	nd	10	30	20	5	25	25	25	20	10	30	25	30	25	10	nd	nd	25	20	15	40	40	50	**28**
	Recouvrement total (%)	100	nd	nd	100	100	70	90	98	100	100	100	nd	100	95	100	100	100	nd	nd	90	80	80	100	100	100	**95**
	Nombre de taxons	43	31	37	45	33	27	17	33	23	46	28	24	33	31	32	29	26	28	31	32	25	25	39	47	49	**33**
	Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{1}
F	*Heracleum sphondylium* L.	1,1	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-1}
	Cruciata laevipes Opiz	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+}
F	*Crepis biennis* L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{1}
	Vicia sepium L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I^{+}
	Vicia segetalis Thuill.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	1	1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	II^{+-1}
Espèces des milieux sains à humides fertiles																											
	Alopecurus pratensis L.	2,3	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-2}
	Poa trivialis L.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	I^{r-+}
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres																											
	Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Carex pallescens L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{1}
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à moyennement fertiles																											
M	*Sanguisorba officinalis* L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{1}
	Trifolium patens Schreb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{1}
C	*Anacamptis laxiflora* (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Scorzonera humilis L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{1}
	Oenanthe peucedanifolia Pollich	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{i}$
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles																											
C	*Potentilla reptans* L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	$+^{+}$
	Cardamine pratensis L.	r	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{r-+}
	Lychnis flos-cuculi L.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{r-+}
C	*Oenanthe pimpinelloides* L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-2}
Espèces à large amplitude																											
	Poa pratensis L.	.	.	.	+	.	.	1,1	.	+	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1,1	1,1	.	1	1	1	III^{+-1}
	Plantago lanceolata L.	2,2	.	1	+	2	1,1	+	2	1	1	.	1,1	1	1,1	.	1	1,2	1	1	1,1	2,2	1,1	1	1	1	V^{+-2}
	Dactylis glomerata L.	2,2	1	+	r	2	.	.	1	1	+	+	.	+	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	1	1	2	III^{r-2}
F	*Tragopogon pratensis* L.	.	.	+	i	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{i-+}
	Daucus carota L.	+,1	.	.	1,1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	II^{+-1}
	Galium mollugo L.	.	.	.	+,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Bromus hordeaceus L.	.	.	.	2,2	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1,1	.	.	.	II^{+-2}
	Trifolium repens L.	2,2	.	+	2,2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	1	1	II^{+-2}
	Holcus lanatus L.	2,2	1	1	+,2	2	.	.	+	+	.	.	2,2	1	.	.	.	2,3	.	1	.	.	.	.	1	.	III^{+-2}
	Trifolium pratense L.	2,2	1	1,2	1,2	.	.	.	.	.	1	.	+	1	.	1	1	.	1,2	1	1,1	.	.	1	2	1	III^{+-2}
	Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{2}
P	*Lolium perenne* L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Trifolium dubium Sibth.	.	1,2	.	2,2	.	1,1	.	.	+	.	1	+	.	.	3	.	.	+	1,2	1,1	2,2	.	.	+	+	III^{+-3}
	Hypochaeris radicata L.	.	1	+	+,2	.	.	.	2	+	1	1	.	.	1,1	1	1	.	.	.	.	2,2	+	1	1	1	III^{+-2}
	Agrostis capillaris L.	2,2	.	1,2	1,1	2	.	.	2	.	3	.	.	1	2,2	2	2	.	+	1	2,2	2,2	1,1	.	2	2	IV^{+-3}
	Taraxacum sect. *Taraxacum*	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I^{r-1}
P	*Cynosurus cristatus* L.	1,1	1	.	+,2	.	.	1,1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2,3	1,2	1	.	.	.	.	1	1	II^{+-2}
	Anthoxanthum odoratum L.	2,2	1,2	1,2	2,2	2	.	.	1	2	2	2	3,3	2	.	.	2	1,2	3	.	1,1	2,2	2,2	2	.	1	IV^{1-3}
	Cerastium fontanum Baumg.	1,1	1	+	.	.	.	+	.	.	+	+	+	.	.	.	.	+	1	+	.	+	+	.	+	+	III^{+-1}
	Ranunculus acris L.	2,2	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	+	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	+	II^{+-2}
F	*Lathyrus pratensis* L.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	.	1	.	1	+	+	1	.	.	1	+	.	.	1	1	1	III^{+-1}
	Achillea millefolium L.	.	.	+	2,2	2	1,1	.	2	2	1	.	+	2	1,1	1	2	.	.	.	1,1	.	2,2	2	2	2	IV^{+-2}
	Rumex acetosa L.	1,1	1	+	+	2	r	.	.	+	1	1	1,1	1	.	2	1	.	.	1	1,1	.	.	1	1	+	IV^{r-2}
P++	*Bellis perennis* L.	.	1	.	1,2	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	+	1	II^{+-1}
Autres taxons																											
F+	*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{1}$
	Vicia sativa L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Orchis mascula (L.) L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Myosotis discolor Pers.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Trifolium subterraneum L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{2}
	Ornithogalum gr. *umbellatum*	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{i}$
	Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I^{+-2}
	Prunus spinosa L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I^{1}
	Veronica L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Centaurea L.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{2}
	Rubus L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	$+^{+}$
Espèces annuelles																											
	Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Cerastium glomeratum Thuill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1,1	.	.	+	.	I^{+-1}
	Ornithopus perpusillus L.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{i}$
	Aira multiculmis Dumort.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Valerianella locusta (L.) Laterr.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I^{r-+}
	Jacobaea vulgaris Gaertn.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	II^{+-1}
	Aira caryophyllea L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Trifolium campestre Schreb.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	^{1}
	Myosotis ramosissima Rochel	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	1,1	2,2	.	.	.	I^{1-2}
	Ervilia hirsuta (L.) Opiz	1,1	.	.	2,2	.	.	.	+	+	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	1	II^{+-2}
	Myosotis gr. *discolor*	+,1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	I^{+-1}
	Sherardia arvensis L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+$
	Ervum tetraspermum L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	1,1	.	.	.	I^{+-1}
	Geranium dissectum L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	I^{+}
	Veronica arvensis L.	.	.	+	+	.	.	.	+	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1,1	.	+	+	+	II^{+-1}
	Vulpia bromoides (L.) Gray	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{2}

Tableau extrait de : Le Hénaff P.- M., Galliot J.-N, Le Gloanec V., Ragache Q. 2021 - Végétations agropastorales du Massif central - Catalogue phytosociologique. Conservatoire botanique national du Massif central, 528 p.