

		222241	222245	222263	222268	222272	383629	383626	222267	383646	338461	213938	302568	SYNTHESE
Numéro relevé														
Altitude (m)		350	470	380	440	470	450	580	350	350	370	370	370	413
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	3	3
Exposition												SE	N	
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	100	20	10	43
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	100	90	100	97
Nombre de taxons		33	39	27	31	39	44	23	44	34	36	38	30	35
<b>Combinaison caractéristique</b>														
C	<i>Serapias lingua</i> L.	1	+	+	+	+	.	+	+	.	+1	.	+	IV <sup>+1</sup>
	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	1	+	1,2	1	1	1	+	+	1	+1	1,1	1,1	V <sup>+1</sup>
	<i>Scorzonera humilis</i> L.	+	1	1	+	+	1	1	1	1	2,2	2,2	.	V <sup>+2</sup>
	<i>Carex panicea</i> L.	+	.	+	1	+	+	+	+	+	+1	2,2	3,3	V <sup>+3</sup>
C	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	+	.	.	.	.	.	.	+	1	1,1	.	.	II <sup>+1</sup>
	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	.	.	+	.	.	.	.	+	+	+1	.	+	III <sup>+</sup>
	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	2,2	.	.	II <sup>+2</sup>
	<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf.	+	+	.	.	.	.	1	1	1	1,2	2,2	.	III <sup>+2</sup>
Ci	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	+	+	II <sup>+2</sup>
	<i>Agrostis canina</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	3,3	I <sup>-3</sup>
<b>Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles</b>														
	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	1	+	1	1	.	+	+	+	+	1,2	+	1,1	V <sup>+1</sup>
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	+	1	1,2	1	1	1	1	.	.	2,2	+	.	IV <sup>+2</sup>
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	+	1,2	+	1,2	1,2	1	.	.	.	.	.	.	III <sup>+1</sup>
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	+	1	.	1	1,2	.	.	1	.	.	1,1	.	III <sup>+1</sup>
	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	.	+	1	.	+	+	.	.	.	1,1 cf	+	.	III <sup>+1</sup>
<b>Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles</b>														
	<i>Festuca rubra</i> L.	1,2	1,2	1	1,2	1	1,2	1,2	1,2	+	2,2	3,3	2,2 cf	V <sup>+3</sup>
	<i>Centaurea jacea</i> L.	+	1	1	2	1	1	.	1	.	2,2	1,1	1,1	IV <sup>+2</sup>
	<i>Leucanthemum cf. ircutianum</i>	1	1	1	1	+	1	1	1,2	.	.	1,1	r	IV <sup>r-1</sup>
	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	1	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	II <sup>+1</sup>
	<i>Vicia gr. sativa</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I <sup>1</sup>
F	<i>Vicia cracca</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1,2	.	.	I <sup>1</sup>
	<i>Vicia angustifolia</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	I <sup>1</sup>
<b>Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles</b>														
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	1	1	1,2	+	1	1	.	.	1	2,2	2,2	2,2	V <sup>+2</sup>
	<i>Nardus stricta</i> L.	+	1	.	.	+	.	.	+	+	.	.	.	III <sup>+1</sup>
	<i>Briza media</i> L.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	II <sup>1</sup>
	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	+	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.	II <sup>+1</sup>
<b>Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles</b>														
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	+	1,2	.	1	.	+	1	+	1	.	+	1,1	IV <sup>+1</sup>
	<i>Primula veris</i> L.	.	1	.	+	+	1	.	.	.	.	.	.	II <sup>+1</sup>
	<i>Galium verum</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I <sup>1</sup>
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I <sup>1</sup>
P-	<i>Holcus mollis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	I <sup>1</sup>
<b>Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles</b>														
	<i>Ajuga reptans</i> L.	.	+	1	.	1	+	1	+	+	1,2	1,1	+	V <sup>+1</sup>
	<i>Cardamine pratensis</i> L.	.	+	+	.	+	1	.	.	1	1,2	r	.	III <sup>r-1</sup>
	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	I <sup>+1</sup>
	<i>Achillea ptarmica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I <sup>1</sup>
	<i>Bromus racemosus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	I <sup>+</sup>
	<i>Carex leporina</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	I <sup>2</sup>
<b>Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles</b>														
	<i>Betonica officinalis</i> L.	1	1	.	.	+	+	.	1,2	.	+1	+	+	IV <sup>+1</sup>
	<i>Genista tinctoria</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+2	2,2	II <sup>+2</sup>
	<i>Carex flacca</i> Schreb.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I <sup>1</sup>
<b>Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres</b>														
	<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West	1	.	.	1	.	.	1	.	+	.	+	+	III <sup>+1</sup>
	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	+	+	.	.	+	.	.	+	+	.	.	1,1	III <sup>+1</sup>
	<i>Succisa pratensis</i> Moench	.	.	.	.	.	+	.	1,2	.	.	.	1,1	II <sup>+1</sup>
	<i>Carex pallescens</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	1,1	II <sup>+1</sup>
<b>Espèces des milieux humides, peu fertiles à moyennement fertiles</b>														
	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	r	+	.	II <sup>r+</sup>
	<i>Carex disticha</i> Huds.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	r	.	I <sup>r+</sup>
	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	.	.	+	.	.	.	.	+	1	i	.	.	II <sup>+1</sup>
<b>Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres</b>														
Ci	<i>Galium album</i> Mill.	.	1	+	1	1	.	.	.	.	.	.	.	II <sup>+1</sup>

	222241	222245	222253	222258	222272	383629	383626	222267	383646	338461	213938	302568	SYNTHESE
Numéro relevé													
Altitude (m)	350	470	380	440	470	450	580	350	350	370	370	370	413
Pente relevé (°)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	3	3
Exposition											SE	N	
Surface (m²)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	100	20	10	43
Recouvrement total (%)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	100	90	100	97
Nombre de taxons	33	39	27	31	39	44	23	44	34	36	38	30	35
<i>Poterium sanguisorba</i> L.		+	.	.	1,2	+	.	.	.	.	.	.	II <sup>+1</sup>
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.		+	.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	II <sup>+</sup>
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.		.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	II <sup>1</sup>
<i>Genista sagittalis</i> L.		.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I <sup>1</sup>
<b>Espèces à large amplitude</b>													
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1	2	+	2	2,2	3,3	3,3	V <sup>+3</sup>
<i>Agrostis capillaris</i> L.	1	1	1	1	1	1	1,2	1	1	2,2	1,1	1,2	V <sup>1-2</sup>
<i>Trifolium pratense</i> L.	+	1,2	.	1	2	1	1	+	1	2,2	+	1,1	V <sup>+2</sup>
<i>Plantago lanceolata</i> L.	1	1	1	1	1	1	.	1	1	+1	2,2	.	V <sup>+2</sup>
<i>Holcus lanatus</i> L.	1	+	.	.	+	+	1	.	+	.	1,1	+2	IV <sup>+1</sup>
<i>Rumex acetosa</i> L.	+	1	.	1	1	+	+	.	.	+1	1,1	.	IV <sup>+1</sup>
<i>Ranunculus acris</i> L.	.	+	.	1	1	+	+	1	1,2	.	1,1	+	IV <sup>+1</sup>
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	+	.	.	1	.	.	.	+	1	2,3	.	.	III <sup>+2</sup>
<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	+	.	+	+	+	.	+	.	.	.	.	II <sup>+</sup>
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	.	+	+	.	+	+	.	+	.	.	.	.	III <sup>+</sup>
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	.	+	.	.	.	+	1	+	.	+1	+	.	III <sup>+1</sup>
F <i>Lathyrus pratensis</i> L.	.	+	2	.	1	.	.	+	1	2,2	+	.	III <sup>+2</sup>
P <i>Cynosurus cristatus</i> L.	1	.	.	1	.	.	1	+	1	1,2	.	r	III <sup>r-1</sup>
P++ <i>Bellis perennis</i> L.	.	.	1	.	+	+	.	.	1	.	r	.	III <sup>r-1</sup>
<i>Achillea millefolium</i> L.	.	+	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	II <sup>r-1</sup>
<i>Trifolium repens</i> L.	.	.	.	+	1	1	.	.	.	.	.	.	II <sup>+1</sup>
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	.	.	.	.	.	+ cf	.	.	.	+1	+ cf	.	II <sup>+</sup>
F <i>Phleum pratense</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I <sup>1</sup>
<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I <sup>1</sup>
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	I <sup>1</sup>
<b>Autres taxons</b>													
F <i>Heracleum sphondylium</i> L.	.	+	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I <sup>+1</sup>
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz	.	+	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	II <sup>+1</sup>
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I <sup>1</sup>
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	I <sup>1</sup>
<b>Espèces des landes</b>													
<i>Genista anglica</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I <sup>1</sup>
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I <sup>+</sup>
<b>Espèces compagnes</b>													
<i>Carex spicata</i> Huds.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I <sup>+</sup>
F <i>Tragopogon pratensis</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I <sup>+</sup>
<i>Polygala vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I <sup>+</sup>
<i>Thymus pulegioides</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I <sup>+</sup>
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I <sup>+</sup>
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I <sup>+</sup>
<i>Trifolium montanum</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I <sup>+</sup>
<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I <sup>+</sup>
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I <sup>+</sup>
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I <sup>+</sup>
<i>Juncus effusus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	I <sup>i</sup>
<i>Prunella vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I <sup>+</sup>
<i>Saxifraga granulata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	I <sup>r</sup>
<i>Narcissus poeticus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I <sup>+</sup>
M <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	I <sup>r</sup>
F <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	I <sup>r</sup>