

	463664	489529	301166	28739	650888	393619	47781	497262	549212	15458	47793	384655	SYNTHESE	
Numéro relevé														
Altitude (m)	1 570	1 440	1 440	1 570	1 380	1 395	1 450	1 500	1 380	1 400	1 400	1 420	1 445	
Pente relevé (°)	60	30	30	30	5	nd	35	35	10	5	nd	nd	27	
Exposition	NE	NE	NE	N	N			N	N	N	N			
Surface (m²)	8	2	2	6	5	30	nd	1	20	50	50	nd	17	
Recouvrement total (%)	95	90	nd	90	85	100	60	100	90	80	80	nd	87	
Nombre de taxons	15	19	14	19	13	25	26	22	19	14	14	14	18	
Combinaison caractéristique														
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	1,1	2	2	.	2	3,3	1,2	2,2	2,2	1,2	1,2	1	V ¹⁻³
	<i>Nardus stricta</i> L.	3,3	2	2,2	2,2	.	4,5	2,3	1,2	4,4	1,2	1,2	4	V ¹⁻⁴
	<i>Galium saxatile</i> L.	2,2	3	3,3	1	2	2,3	2,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1	V ¹⁻³
M	<i>Scorzoneroides pyrenaica</i> (Gouan) Holub	+	1	1	1	2	2,2	1	+	+	1	1	1	V ²⁻²
	<i>Carex pilulifera</i> L.	1,1	+	+	.	+	1,1	1	.	.	+2	+2	+	IV ¹⁻¹
M	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	+	+	+	1	.	+	1	i	.	.	.	+	IV ¹⁻¹
	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	.	.	3	.	3	.	1,2	II ¹⁻³
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	.	.	.	+	1	1,1	II ¹⁻¹
M	<i>Trifolium alpinum</i> L.	2,2	1	1	2,3	II ¹⁻²
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres														
M	<i>Potentilla aurea</i> L.	.	1	1	1	.	r	2	+	III ²⁻²
	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	1,1	2	+	1,1	2	2	1	III ²⁻²
M	<i>Gentiana lutea</i> L.	+	.	.	2,3	.	.	.	2,2	.	.	.	1	II ²⁻²
	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	+3	1,2	1,2	.	II ¹⁻¹
M	<i>Thesium alpinum</i> L.	+	.	.	1	1	II ¹⁻¹
S	<i>Alchemilla gr. alpina</i>	.	.	.	2	I ²
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles														
	<i>Festuca rubra</i> L.	+ cf	.	3,3 cf	3,3	1 cf	II ¹⁻³
	<i>Veronica officinalis</i> L.	.	+	+	.	.	+	2	II ¹⁻²
M	<i>Anemone nemorosa</i> L.	1	1,1	1	1	II ¹
M	<i>Campanula scheuchzeri</i> subsp. <i>lanceolata</i> (Lapeyr.) J.-M.Tison	+	.	.	1	.	.	.	1,1	II ¹⁻¹
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles														
M	<i>Viola lutea</i> Huds.	.	.	.	1	.	1,1	.	.	1,1	.	.	.	II ¹
M	<i>Poa chaixii</i> Vill.	1,2	.	.	2,2	.	.	.	I ¹⁻²
	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	+	+	+	II [*]
M	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	1,1	1	1,1	1,1	1	1	.	III ¹
M	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	1,1	+	.	+1	II ¹⁻¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles														
	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	1,1	.	.	r	.	.	.	I ¹⁻¹
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	+	I [*]
M	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>pseudocollinus</i> (P.Fourn.) Jauzein	+	.	.	.	I [*]
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles														
M	<i>Arnica montana</i> L.	+	+	.	I [*]
	<i>Serratula tinctoria</i> L.	r	.	.	+	.	.	.	I ¹⁻²
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	1,1	I ¹
Espèces des landes														
M	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	3,3	2	2	2,2	1	.	2,4	3,3	1,1	1	1	1	V ¹⁻³
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	1,1	.	.	.	+	.	+	.	1,1	+	+	1	III ¹⁻¹
	<i>Genista pilosa</i> L.	+	.	.	.	1,1	+	+	.	II ¹⁻¹
M	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	1,1	.	.	2,3	I ¹⁻²
Espèces à large amplitude														
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	.	2	2	2,3	2	1,1	3,4	1,1	1,1	.	.	.	IV ¹⁻³
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	.	2	2	1,2	1	+	1,2	2,2	1,1	.	.	.	IV ¹⁻²
	<i>Rumex acetosa</i> L.	+	+	.	i	.	.	.	II ¹⁻²
F	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	+	I [*]
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	+	I [*]
Autres taxons														
	<i>Hieracium murorum</i> L.	r	I [*]
M	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	.	.	.	1	I ¹
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	.	.	.	+	I [*]
	<i>Melampyrum pratense</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	+	I ¹⁻¹
	<i>Festuca microphylla</i> (St.-Yves) Patzke	1,1	I ¹
	<i>Hieracium sect. Italica</i> (Fr.) Arv.-Touv.	1,1	I ¹
	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	1	I ¹
	<i>Ranunculus platanifolius</i> L.	1,1	I ¹
	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	r	I [*]
M	<i>Epikeros pyrenaicus</i> (L.) Raf.	1,1	.	.	.	I ¹
	<i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schult.	+	I [*]
Genres														
	<i>Festuca</i> L.	.	3	I ³
	<i>Cerastium</i> L.	.	.	+	I [*]
	<i>Narcissus</i> L.	+	I [*]
	<i>Ranunculus</i> L.	+	I [*]
Bryophytes														
	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.	.	+	1,2	I ¹⁻¹
	<i>Polytrichum alpinum</i> (Hedw.) G.L.Sm.	.	+	2,2	I ¹⁻²
	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.	.	+	+	I [*]
	<i>Barbilophozia lycopodioides</i> (Wallr.) Loeske	.	+	I [*]
	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.	.	+	I [*]
	<i>Rhodobryum roseum</i> (Hedw.) Limpr.	.	+	I [*]