

Festuca rubrae-Genistetum sagittalis Issler 1927

| | Numéro relevé | | | | | | | | | | SYNTHESE | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------------|
| | 384393 | 384396 | 384398 | 384400 | 384407 | 384414 | 384430 | 384418 | 384434 | 655751 | | |
| Altitude (m) | 880 | 925 | 1 045 | 1 000 | 920 | 860 | 650 | 1 100 | 810 | 540 | 873 | |
| Pente relevé (°) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| Exposition | | | | | | | | | | ENE | | |
| Surface (m²) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| Recouvrement total (%) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| Nombre de taxons | 29 | 42 | 36 | 32 | 35 | 34 | 18 | 24 | 27 | 60 | 34 | |
| Combinaison caractéristique | | | | | | | | | | | | |
| M | <i>Genista sagittalis</i> L. | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 4,5 | V ⁺⁴ |
| | <i>Thymus pulegioides</i> L. | + | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | . | V ⁺¹ |
| | <i>Galium verum</i> L. | 1 | + | 1 | + | + | 1 | + | + | 1 | +2 | V ⁺¹ |
| | <i>Potentilla fagineicola</i> Lamotte | 1,2 | + | + | 1 | + | 1 | 1 | + | . | . | IV ⁺¹ |
| | <i>Polygala vulgaris</i> L. | + | + | + | + | + | . | . | . | . | +2 | III ⁺ |
| | <i>Ranunculus bulbosus</i> L. | . | + | + | . | + | + | . | + | . | 1,1 | III ⁺¹ |
| | <i>Euphorbia cyparissias</i> L. | + | + | . | . | 1 | + | . | . | . | +2 | III ⁺¹ |
| | <i>Festuca filiformis</i> Pourr. | 3 | 1,2 | 1,2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | III ⁻³ |
| | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. | . | + | . | . | 1 | . | 1,2 | . | . | 3,5 | II ⁺³ |
| | <i>Galium pumilum</i> Murray | . | + | 1 | . | + | . | . | . | + | . | II ⁺¹ |
| Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Nardus stricta</i> L. | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1,2 | 1,2 | + | 2 | . | V ⁺⁴ |
| | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC. | + | 1,2 | + | + | + | 1 | 1 | + | + | 1,3 | V ⁺¹ |
| | <i>Asperula cynanchica</i> L. | 1 | + | + | 1 | + | . | . | . | . | . | III ⁺¹ |
| | <i>Briza media</i> L. | + | . | + | . | . | . | . | . | . | +2 | II ⁺ |
| | <i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer | . | + | . | . | . | . | . | + | . | 2,3 | II ⁺² |
| | <i>Carlina vulgaris</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | I ⁺ |
| Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Pilosella officinarum</i> Vaill. | 1 | + | 1 | 1 | + | . | + | + | 1 | 2,3 | V ⁺² |
| | <i>Carex caryophylla</i> Latourr. | + | + | 1 | + | 1 | 1 | . | + | . | +2 | IV ⁺¹ |
| | <i>Lotus corniculatus</i> L. | . | + | + | 1 | 1 | 1 | . | + | 1 | +2 | IV ⁺¹ |
| | <i>Hypericum perforatum</i> L. | + | + | . | . | . | + | . | . | . | +2 | II ⁺ |
| | <i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop. | . | + | + | + | . | . | . | . | + | . | II ⁺ |
| M | <i>Cerastium arvense</i> L. | . | + | + | . | . | . | . | + | . | . | II ⁺ |
| | <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort. | . | . | . | + | . | 1 | . | . | . | . | I ⁺¹ |
| | <i>Juniperus communis</i> L. | . | . | . | 1 | . | . | . | + | . | . | I ⁺¹ |
| R- | <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult. | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | I ¹ |
| M | <i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>pseudocolinus</i> (P.Fourn.) Jauzein | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | I ¹ |
| | <i>Festuca ovina</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,5 | I ⁴ |
| | <i>Leontodon hispidus</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | I ⁺ |
| Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Rumex acetosella</i> L. | + | + | + | + | . | . | . | . | . | +2 | III ⁺ |
| | <i>Scleranthus perennis</i> L. | 1,2 | . | + | + | . | . | . | . | . | +2 | II ⁺¹ |
| | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch. | . | + | . | + | 1 | 1 | . | . | . | . | II ⁺¹ |
| | <i>Campanula rotundifolia</i> L. | . | . | + | . | . | . | . | . | + | +2 | II ⁺ |
| | <i>Poterium sanguisorba</i> L. | + | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | I ⁺¹ |
| | <i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | I ² |
| | <i>Potentilla verna</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | + | . | 1,2 | I ⁺¹ |
| Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles | | | | | | | | | | | | |
| F | <i>Vicia cracca</i> L. | . | + | + | + | . | . | . | . | . | . | II ⁺ |
| | <i>Veronica officinalis</i> L. | . | 1 | + | . | + | . | . | . | . | +2 | II ⁺¹ |
| Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Carex pilulifera</i> L. | . | 1 | + | + | + | + | . | . | . | . | III ⁺¹ |
| | <i>Linum catharticum</i> L. | . | . | + | + | + | . | . | . | . | . | II ⁺ |
| M | <i>Poa chaixii</i> Vill. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | I ¹ |
| | <i>Polygala serpyllifolia</i> Hose | . | . | . | . | . | . | 1,2 | . | + | . | II ⁺¹ |
| M | <i>Hypericum maculatum</i> Crantz | . | . | . | . | . | + | . | . | 1 | . | I ⁺¹ |
| | <i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | I ¹ |
| Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Festuca gr. rubra</i> | + | + | + | . | 1 | 1 | . | . | 2 | . | III ⁺² |
| | <i>Veronica chamaedrys</i> L. | . | + | . | . | + | . | + | + | . | +2 | III ⁺ |
| | <i>Stellaria graminea</i> L. | . | + | . | + | . | . | . | . | . | . | I ⁺ |
| | <i>Festuca heteromalla</i> Pourr. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| Espèces des landes | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull | + | 1 | + | 2 | 2 | . | 1 | 1 | . | +3 | IV ⁺² |
| | <i>Genista pilosa</i> L. | . | 1 | 1 | . | 1,2 | 1 | . | 1 | . | +2 | III ⁺¹ |
| | <i>Genista anglica</i> L. | . | . | . | . | . | + | 1 | . | 1,2 | . | II ⁺¹ |
| Espèces des milieux secs, très maigres à maigres | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Jasione montana</i> L. | + | . | . | + | . | . | . | . | . | +2 | II ⁺ |
| | <i>Sedum rupestre</i> L. | . | . | . | + | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Koeleria gr. pyramidata</i> | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | I ¹ |
| Espèces à large amplitude | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Agrostis capillaris</i> L. | . | + | 1 | . | + | 1 | 1 | + | . | 3,5 | IV ⁺³ |
| | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. | . | + | + | 1 | 1 | . | 1 | + | . | 1,2 | IV ⁺¹ |

| | 384393 | 384396 | 384398 | 384400 | 384407 | 384414 | 384430 | 384418 | 384434 | 685751 | SYNTHESE |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Numéro relevé | | | | | | | | | | | |
| Altitude (m) | 880 | 925 | 1 045 | 1 000 | 920 | 860 | 650 | 1 100 | 810 | 540 | 873 |
| Pente relevé (°) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Exposition | | | | | | | | | | ENE | |
| Surface (m²) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Recouvrement total (%) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Nombre de taxons | 29 | 42 | 36 | 32 | 35 | 34 | 18 | 24 | 27 | 60 | 34 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|-------------------|
| | <i>Trifolium repens</i> L. | + | + | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | 1,2 | III ⁺¹ |
| | <i>Trifolium pratense</i> L. | . | . | 1 | . | + | . | + | + | 1 | +2 | III ⁺¹ |
| | <i>Trifolium dubium</i> Sibth. | + | + | 1 | 1 | . | . | . | . | + | . | III ⁺¹ |
| | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg. | + | + | . | + | + | . | . | . | + | . | III ⁺ |
| | <i>Plantago lanceolata</i> L. | 1 | . | + | . | . | . | . | . | + | 1,2 | II ⁺¹ |
| | <i>Achillea millefolium</i> L. | . | + | . | . | . | + | . | . | . | 1,1 | II ⁺¹ |
| | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke | . | + | . | . | . | + | . | . | . | . | I ⁺ |
| P | <i>Cynosurus cristatus</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | + | 1 | . | I ⁺¹ |
| | <i>Holcus lanatus</i> L. | . | . | . | . | + | . | . | . | + | . | I ⁺ |
| | <i>Poa pratensis</i> L. | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | +2 | I ⁺¹ |
| | <i>Hypochaeris radicata</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +2 | I ⁺ |
| Espèces annuelles | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Aira caryophyllea</i> L. | . | . | + | + | . | . | . | . | . | 1,3 | II ⁺¹ |
| | <i>Ornithopus perpusillus</i> L. | + | 1 | . | + | . | . | . | . | . | . | II ⁺¹ |
| Autres taxons | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link | . | . | . | . | . | 1,2 | 1,2 | + | . | . | II ⁺¹ |
| | <i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm. | + | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| Espèces compagnes | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Eryngium campestre</i> L. | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I ⁺ |
| | <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm. | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | I ⁺ |
| M | <i>Viola lutea</i> Huds. | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | I ⁺ |
| | <i>Viola canina</i> L. | . | + | . | . | . | . | . | . | 1 | . | I ⁺¹ |
| | <i>Carex ericetorum</i> Pollich | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | I ⁺ |
| | <i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i> | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | I ⁺ |
| | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC. | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | I ⁺ |
| | <i>Alchemilla</i> gr. <i>hybrida</i> | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | I ⁺ |
| M | <i>Gentiana lutea</i> L. | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | I ⁺ |
| | <i>Galium saxatile</i> L. | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | I ⁺ |
| | <i>Arnica montana</i> L. | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | I ⁺ |
| | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv. | . | . | . | . | . | . | . | + | . | . | I ⁺ |
| M | <i>Ranunculus serpens</i> Schrank | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | I ⁺ |
| M | <i>Centaurea nigra</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | I ⁺ |
| | <i>Leucanthemum</i> cf. <i>ircutianum</i> | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | I ⁺ |
| | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | I ⁺ |
| | <i>Thymus</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,2 | I ² |
| | <i>Galium</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,2 | I ¹ |
| | <i>Dianthus carthusianorum</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Rhinanthus minor</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Pimpinella saxifraga</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Poa nemoralis</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Trifolium medium</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Orchis mascula</i> (L.) L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | I ⁺ |
| | <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Silene nutans</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Vicia angustifolia</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Trifolium micranthum</i> Viv. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Campanula persicifolia</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Myosotis discolor</i> Pers. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Myosotis</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | I ⁺ |
| | <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Trifolium arvense</i> L. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | I ⁺ |
| | <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| | <i>Trifolium campestre</i> Schreb. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | I ⁺ |
| C F | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | I ⁺ |