

Lino angustifolii-Cynosuretum cristati

P. Allorge ex Tüxen & Oberd. 1958 nom. corr. (art. 44)

		Numéro relevé		640544	640545	640550	640556	665812	640562	640710	640730	662967	662976	SYNTHESE
		Altitude (m)		132	132	134	142	60	136	128	142	nd	nd	126
		Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	2	nd	nd	nd	nd	nd	2
		Exposition						E						
		Surface (m²)		40	40	40	25	100	50	50	50	501	50	95
		Recouvrement total (%)		100	100	100	100	nd	100	100	100	100	100	100
		Nombre de taxons		47	33	50	45	33	39	45	39	34	44	41
Combinaison caractéristique														
Ci		<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell.		1	2	1	2	+2	2	1	1	1	+	V ⁻²
		<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.		2,3	I ²
		<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv.		.	.	+	1	2,2	.	2	2	+	1	IV ⁺²
	P	<i>Cynosurus cristatus</i> L.		1	.	1	2	1,2	1	2	2	2	1	V ⁺²
		<i>Leontodon hispidus</i> L.		.	1	.	.	+2	I ⁻¹
		<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.		1	.	.	1	.	1	.	.	+	1	III ⁺¹
		<i>Ranunculus bulbosus</i> L.		+	.	1	.	.	1	.	.	2	+	III ⁺²
		<i>Rhinanthus minor</i> L.		.	.	.	2	2	2	II ²
		<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.		1	2	2	2	+2	2	1	.	1	.	IV ⁺²
		<i>Holcus lanatus</i> L.		2	2	1	2	1,2	2	2	2	1	1	V ⁺²
C		<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.		+	1	1	2	.	1	2	2	1	2	V ⁺²
		<i>Bromus racemosus</i> L.		1	1	1	1	+2	1	2	2	.	1	V ⁺²
	C	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.		2	2	1	1	.	1	1	2	.	1	IV ⁺²
		<i>Geranium dissectum</i> L.		2	2	1	1	.	1	1	2	.	.	IV ⁺²
		<i>Dactylis glomerata</i> L.		.	2	1	1	1,1	1	1	1	1	1	V ⁺²
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles		<i>Trifolium pratense</i> L.		1	1	+	1	2,3	1	2	.	2	2	V ⁺²
	C	<i>Allium vineale</i> L.		+	+	+	.	.	1	II ⁺¹
		<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.		1	I ¹
		<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase		.	.	1	+	.	I ⁺¹
		<i>Scabiosa columbaria</i> L.		+	.	I ⁺
		<i>Lotus corniculatus</i> L.		2	.	2	1	+2	2	.	.	.	1	III ⁺²
		<i>Galium verum</i> L.		1	.	+	.	.	2	1	1	.	1	III ⁺²
	C	<i>Ophrys apifera</i> Huds.		.	.	1	I ¹
		<i>Briza media</i> L.		+	.	.	.	+	2	II ⁺²
		<i>Crepis vesicaria</i> L.		.	.	.	1	I ¹
Ci F		<i>Vicia angustifolia</i> L.		+	.	.	.	+	.	I ⁺
	F	<i>Vicia cracca</i> L.		1	1	+	.	II ⁺¹
		<i>Prunella vulgaris</i> L.		.	.	.	1	I ¹
		<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.		.	.	1	+	1,1 cf	.	.	1	.	2 cf	III ⁺²
C F		<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coul.		.	.	.	2	I ²
	M	<i>Centaurea nigra</i> L.		+2	I ⁺
		<i>Veronica chamaedrys</i> L.		+	+	.	+	+	.	II ⁺
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles		<i>Colchicum autumnale</i> L.		.	.	2	.	.	2	+	.	.	.	II ⁺²
		<i>Festuca rubra</i> L.		3	.	3	2	+2	2	.	.	+	2	IV ⁺³
		<i>Carex spicata</i> Huds.		+	+	+	+	.	.	II ⁺
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles		<i>Vicia segetalis</i> Thuill.		.	+	+	1	.	.	1	1	.	.	III ⁺¹
		<i>Crepis biennis</i> L.		+	2	+	1	.	1	2	1	.	.	IV ⁺²
Espèces des milieux sains à humides fertiles		<i>Convolvulus sepium</i> L.		2	2	3	.	.	II ⁺³
		<i>Alopecurus pratensis</i> L.		2	.	.	.	+	I ⁺²
		<i>Rumex crispus</i> L.		1	1	+	.	+	+	1	2	.	.	IV ⁺²
		<i>Poa trivialis</i> L.		1	1	+	1	.	1	1	.	.	+	IV ⁺¹
Espèces des milieux frais moyenement fertiles		<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.		1	.	1	.	.	I ¹
		<i>Ajuga reptans</i> L.		1	1	+	2	II ⁺²
		<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.		1	1	1	.	.	1	3	2	.	.	III ⁺³
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à moyenement fertiles		<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase		.	.	+	1	I ⁺¹
		<i>Lysimachia nummularia</i> L.		.	1	I ¹
		<i>Trifolium patens</i> Schreb.		+	.	3	3,4	1	3	3	.	.	+	IV ⁺³
		<i>Trifolium fragiferum</i> L.		1	I ¹
		<i>Lotus glaber</i> Mill.		2	I ²
		<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.		1	.	.	1	2	II ⁺²
		<i>Potentilla reptans</i> L.		1	2	.	1	.	2	1	1	.	1	IV ⁺¹
Espèces des milieux frais à humides, moyenement fertiles à fertiles		<i>Carex hirta</i> L.		+	1	2	.	+	.	II ⁺²
		<i>Ranunculus repens</i> L.		1	2	2	.	.	.	II ⁺²
		<i>Agrostis stolonifera</i> L.		+	2	2	.	1	.	II ⁺²

		Numéro relevé										SYNTHESE
		640544	640545	640550	640556	665812	640562	640710	640730	662967	662976	SYNTHESE
	Altitude (m)	132	132	134	142	60	136	128	142	nd	nd	126
	Pente relevé (°)	nd	nd	nd	nd	2	nd	nd	nd	nd	nd	2
	Exposition					E						
	Surface (m²)	40	40	40	25	100	50	50	50	501	50	95
	Recouvrement total (%)	100	100	100	100	nd	100	100	100	100	100	100
	Nombre de taxons	47	33	50	45	33	39	45	39	34	44	41
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray		+	1	.	.	I-1
Espèces à large amplitude		
	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	2	2	2	1	.	2	2	2	.	1	IV-1-2
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	2	2	.	2	3,4	1	1	3	.	1	IV-1-3
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	2	1	1	2	2,2	1	1	1	2	2	V-1-2
F	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	2	3	2	1	.	3	2	1	.	.	IV-1-3
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	2	2	2	2	.	2	1	2	.	+	IV-1-2
	<i>Rumex acetosa</i> L.	1	+	+	2	.	2	1	.	.	1	IV-1-2
P	<i>Lolium perenne</i> L.	.	+	+	1	1,2	.	2	1	1	.	IV-1-2
	<i>Poa pratensis</i> L.	+	.	1	.	+,2	II-1-1
	<i>Ranunculus acris</i> L.	2	2	1	2	+	2	2	2	2	2	V-1-2
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	.	+	2	2,2	1	1	.	2	.	III-1-2
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	1	2	2	1	.	.	2	.	.	.	III-1-2
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	+	+	.	1	+,2	1	.	+	1	1	IV-1-1
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	+	.	.	1	1,1	.	1	+	+	.	III-1-1
P++	<i>Bellis perennis</i> L.	+	.	.	.	+	+	II-1-1
	<i>Trifolium repens</i> L.	.	.	.	1	1,2	.	2	.	3	.	II-1-3
	<i>Galium mollugo</i> L.	+	.	I+
	<i>Achillea millefolium</i> L.	I
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	1	.	I
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	1	.	I
F	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	+	1	I-1
Autres taxons		
	<i>Daucus carota</i> L.	.	.	.	2	+	1	.	.	+	.	II-1-2
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	.	.	+	1	.	1	II-1-1
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	.	1	+	1	.	.	+	.	1	.	II-1-1
F	<i>Phleum pratense</i> L.	1	1	.	.	.	I
	<i>Carex flacca</i> Schreb.	+	.	I
C	<i>Serapia lingua</i> L.	+	I
C	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	1	I
	<i>Betonica officinalis</i> L.	1	.	.	I
	<i>Galium debile</i> Desv.	+	.	1	.	.	I-1-1
	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	.	.	+	I
	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	+	.	+	I
	<i>Rumex sanguineus</i> L.	.	.	+	.	.	+	I
	<i>Carex divulsa</i> Stokes	+	.	I
	<i>Trifolium squamosum</i> L.	.	.	2	.	+,2	I-2
	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	.	.	1	I
	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	1	I
	<i>Crepis</i> L.	2	.	I-2
	<i>Succisa pratensis</i> Moench	+	I
C	<i>Plantago media</i> L.	+	+	I
C	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	+	.	+	1	+	II-1-1
C	<i>Carex otrubae</i> Podp.	+	.	.	I
	<i>Juncus effusus</i> L.	+	.	I
	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	.	.	.	+	I
C	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray	+	I
	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	+	.	.	I
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	1,2	I
	<i>Myosotis dubia</i> Arond.	1	.	1	+	.	+	II-1-1
	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	+	I
Espèces annuelles		
	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	+	.	.	.	+,2	I
	<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz	+	2	1	1	II-1-2
	<i>Medicago lupulina</i> L.	.	.	+	I
	<i>Veronica arvensis</i> L.	+	.	+	I