

Polygalo vulgaris-Festucetum nigrescentis Le Hénaff & Pouvaret ass. nov.

Numéro relevé	512667	384329	497539	512655	546484	512629	384320	515345	SYNTHESE
Altitude (m)	535	630	625	535	570	600	740	935	646
Pente relevé (%)	1	nd	20	5	20	20	nd	5	12
Exposition	NO		N	SO	S	O		SE	
Surface (m ²)	20	nd	16	6	nd	nd	nd	15	14
Recouvrement total (%)	95	nd	95	65	nd	100	nd	90	89
Nombre de taxons	21	26	27	23	20	31	27	28	25
Combinaison caractéristique									
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	3,3	1,2	3,3	4,4	4	3,3	1,2	3,3	V ¹⁻⁴
<i>Polygala vulgaris</i> L.	1,3	2	2,2	.	+	1,1	1	1,1	V ⁺²
<i>Agrostis capillaris</i> L.	3,3	.	2,2	2,2	.	2,2	.	3,3	IV ²⁻³
<i>Thymus pulegioides</i> L.	.	2	2,2	1,1	.	1,1	.	1,3	IV ¹⁻²
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	+	+	.	2,2	1	1,1	1	2,2	V ⁺²
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	.	+2	+	3,3	4	1,1	.	.	IV ⁺⁴
<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	.	1,2	3,3	1,1	1	2,2	.	1,1	IV ¹⁻³
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres									
<i>Rumex acetosella</i> L.	.	+	+	1,1	1	.	.	1,3	IV ⁺¹
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch.	.	.	.	+	.	.	1	1,1	II ⁺¹
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	+	.	.	+	.	1,1	.	.	II ⁺¹
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	1	.	I ¹
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	.	1	I ¹
<i>Jasione laevis</i> Lam.	.	.	1,1	I ¹
<i>Scleranthus perennis</i> L.	.	.	.	1,1	I ¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles									
<i>Lotus corniculatus</i> L.	2,2	+	+	+	+	2,2	1	+	V ⁺²
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	.	.	2,2	2,2	.	+	.	.	II ⁺²
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	1,1	+	.	+	II ⁺¹
<i>Leontodon hispidus</i> L.	.	+	1,1	II ⁺¹
<i>Ononis spinosa</i> L.	.	.	2,2	I ²
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	.	.	1,1	I ¹
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles									
<i>Briza media</i> L.	.	+	.	.	.	2,2	1	+	III ⁺²
<i>Nardus stricta</i> L.	.	1	2	2,2	II ¹⁻²
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	.	.	.	1,3	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles									
<i>Leucanthemum cf. ircutianum</i>	1,1	+	.	.	.	2,2	1	1,1	IV ⁺²
<i>Centaurea jacea</i> L.	1,1	.	.	+	.	+	.	1,1	III ⁺¹
F <i>Knautia arvensis</i> (Briq.) Szabó	2,2	I ²
<i>Centaurea subgen. Jacea</i> (Mill.) Hayek	1	.	I ¹
<i>Vicia angustifolia</i> L.	.	.	+	.	+	.	.	.	II ⁺
C F <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coul.	1,1	.	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles									
<i>Stellaria graminea</i> L.	i	1	.	.	.	1,1	+	1,1	IV ⁱ⁻¹
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	1,1	I ¹
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles									
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	.	+	.	.	.	2,2	.	1,1	II ⁺²
P- <i>Holcus mollis</i> L.	.	+	1,1	II ⁺¹
<i>Galium verum</i> L.	2,2	I ²
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles									
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	1	.	I ¹
<i>Betonica officinalis</i> L.	2,2	.	.	I ²
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles									
<i>Ajuga reptans</i> L.	1	.	I ¹

	Numéro relevé									SYNTHESE
	512667	384329	497539	512655	546484	512629	384320	515345		
Altitude (m)	535	630	625	535	570	600	740	935	646	
Pente relevé (°)	1	nd	20	5	20	20	nd	5	12	
Exposition	NO	N	SO	S	O			SE		
Surface (m²)	20	nd	16	6	nd	nd	nd	15	14	
Recouvrement total (%)	95	nd	95	65	nd	100	nd	90	89	
Nombre de taxons	21	26	27	23	20	31	27	28	25	
<i>Scorzonera humilis</i> L.	1	1,3	II ¹	
<i>Carex hirta</i> L.	2,2	I ²	
Espèces à large amplitude										
<i>Plantago lanceolata</i> L.	2,2	+	2,2	1,1	+	1,1	1	2,2	V ⁺²	
<i>Achillea millefolium</i> L.	2,2	1	3,3	2,2	.	2,2	.	2,2	IV ¹⁻³	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	2,2	.	2,2	r	+	2,2	.	1,1	IV ^{r-2}	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	r	+	3,3	.	.	2,2	1,2	1,1	IV ^{r-3}	
<i>Trifolium repens</i> L.	2,2	+	1,1	.	.	1,1	1	2,2	IV ⁺²	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	+ cf	1 cf	+	.	.	1,1 cf	.	1,1 cf	IV ⁺¹	
<i>Rumex acetosa</i> L.	.	.	+	.	.	+	+	1,1	III ⁺¹	
<i>Trifolium pratense</i> L.	2,2	1,1	1	2,2	III ¹⁻²	
<i>Holcus lanatus</i> L.	+	.	+	+	II ⁺	
<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	1,1	.	.	+	.	III ⁺¹	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	.	+	.	.	.	2,2	.	.	II ⁺²	
P <i>Cynosurus cristatus</i> L.	2,2	I ²	
Espèces annuelles										
<i>Aira caryophyllea</i> L.	.	.	+	r	+	.	.	.	II ^{r+}	
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	.	.	1,1	.	+	r	.	.	II ^{r-1}	
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz	1,1	.	.	I ¹	
Autres taxons										
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	.	1	.	+	.	1,1	.	.	II ⁺¹	
<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm.	.	+	1,1	.	.	+ cf	.	.	II ⁺¹	
<i>Ulex minor</i> Roth	2	.	.	.	I ²	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	+	.	I ⁺	
<i>Viola canina</i> L.	+	.	I ⁺	
<i>Carex panicea</i> L.	+	.	I ⁺	
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	+	.	I ⁺	
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	+	I ⁺	
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	.	.	+2	I ⁺	
<i>Daucus carota</i> L.	.	.	i	I ¹	
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	r	.	.	I ^r	
<i>Veronica arvensis</i> L.	.	.	.	+	I ⁺	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	.	.	.	r	I ^r	
<i>Jasione montana</i> L.	+	.	.	.	I ⁺	
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.	+	.	.	.	I ⁺	
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	+	.	.	.	I ⁺	
<i>Hypericum humifusum</i> L.	+	.	.	.	I ⁺	
<i>Centaurea</i> L.	+	.	.	.	I ⁺	