

Alchemilla saxatilis-*Antennarietum dioicae* Choisnet & Mulot ex ass. nov.

Numéro relevé	303304	303298	303317	303301	303319	371854	303405	303408	303459	303263	SYNTHESE
	Altitude (m)	1 410	1 390	1 430	1 410	1 440	1 210	1 250	1 260	1 370	
Pente relevé (°)	nd	5	10	5	15	15	nd	10	20	15	12
Exposition		ONO	NE	ONO	S	O		NNE	ENE	N	
Surface (m²)	10	10	30	30	15	20	20	30	30	10	21
Recouvrement total (%)	90	100	95	98	90	90	95	80	90	90	92
Nombre de taxons	25	27	30	24	27	28	28	24	25	20	26
Combinaison caractéristique											
M <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	2,3	2,2	2,3	2,2	+2	+2	2,2	1,1	2,3	+	V ⁺²
S <i>Alchemilla saxatilis</i> Buser	1,1	2,2	1,2	2,2	+2	1,1	.	1,2	+2	1,1	V ⁺²
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	+	+	.	r	+	.	+	+	r,2	+	IV ^{r+}
<i>Jasione laevis</i> Lam.	1,1	.	1,1	.	1,1	1,2	1,1	+2	1,1	.	IV ^{r+}
<i>Thymus pulegioides</i> L.	1,1	1,1	1,1	1,1	2,2	1,2	III ¹⁻²
M <i>Scorzoneroides pyrenaica</i> (Gouan) Holub	.	+	+	1,1	.	1,1	.	1,1	2,2	.	III ⁺²
S <i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.	1,1	1,1	+	II ^{r+}
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles											
<i>Nardus stricta</i> L.	2,2	2,2	3,3	4,4	3,3	4,4	4,4	4,5	3,3	4,5	V ²⁻⁴
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	3,3	3,3	2,2	3,3	2,2	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	V ¹⁻³
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	1,1	2,2	1,1	1,1	1,1	2,2	1,1	2,2	+	1,1	V ⁺²
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	.	1,2	.	1,2	+	.	+	2,2	+	1,1	IV ⁺²
M <i>Hypochaeris maculata</i> L.	+	+	1,1	r	1,1	.	III ⁻¹
<i>Galium saxatile</i> L.	.	.	.	+	.	+2	1,1	2,2	+	.	III ⁺²
M <i>Amica montana</i> L.	.	.	+	+	.	+	1,1	1,1	1,1	.	III ⁻¹
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	3,3	I ³
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres											
<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	+	1,2	1,1	+	1,1	1,1	1,1	1,2	2,2	+	V ⁺²
<i>Carex caryophylla</i> Latour.	2,2	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	.	1,1	+	V ⁺²
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	.	+	+	+	.	+	.	1,1	.	.	III ⁻¹
<i>Festuca gr. ovina</i>	1,2	.	2,2	.	2,2	1,1	II ¹⁻²
<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	.	1,1	.	+	.	+	.	+	.	II ⁻¹
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	+	1,2	.	.	.	r	II ⁻¹
M <i>Crepis coryzifolia</i> (Gouan) A.Kern.	2,2	.	I ²
M <i>Gentiana campestris</i> (L.) Bömer	1,1	+2	.	.	I ⁻¹
C <i>Plantago holostium</i> Scop.	2,2	.	.	.	+	.	I ⁺²
<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás	2,2	1,2	I ⁻²
<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat	1,1	1,1	I ¹
M <i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguelen	1,1	.	.	.	I ¹
M <i>Potentilla fagineicola</i> Lamotte	.	r	r	I ¹
<i>Scleranthus perennis</i> L.	+	.	.	.	+	I ¹
R <i>Ammeria arenaria</i> (Pers.) Schult.	1,1	I ¹
<i>Rumex acetosella</i> L.	+	.	+2	I ¹
Espèces des landes											
<i>Genista pilosa</i> L.	2,2	1,1	+	1,1	1,2	1,1	.	.	.	1,2	IV ⁺²
M <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	2,2	2,2	+	1,1	+	2,2	III ⁺²
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	+	r	.	+	.	+	1,1	2,2	.	.	III ⁻²
<i>Genista anglica</i> L.	1,1	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles											
M <i>Campanula scheuchzeri</i> subsp. <i>lancoolata</i> (Lapeyr.) J.-M.Tison	+	r	.	.	I ^{r+}
<i>Veronica officinalis</i> L.	r	.	.	+	.	I ^{r+}
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles											
<i>Carex pilulifera</i> L.	2,2	2,2	1,1	1,1	.	.	.	2,2	.	2,2	III ¹⁻²
<i>Galium verum</i> L.	.	.	+	.	+	+cf	III ¹
M <i>Meum athamanticum</i> Jacq.	.	+	1,1	+	+	.	III ⁻¹
M <i>Viola lutea</i> Huds.	1,1	1,1	.	+	III ⁻¹
M <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	.	+	.	+	+	+	III ¹
M <i>Gentiana lutea</i> L.	1,2	r	.	I ⁻¹
<i>Viola canina</i> L.	+	.	.	.	1,1	I ⁻¹
M <i>Ranunculus serpens</i> Schrank	1,1	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles											
<i>Festuca gr. rubra</i>	2,2	2,2	3,3	3,3	2,2	2,2	1,1	.	.	.	IV ¹⁻³
<i>Leucanthemum cf. ircutianum</i>	.	.	r	+	.	.	+	.	.	.	II ^{r+}
M <i>Anemone nemorosa</i> L.	.	+	1,2	1,2	II ⁻¹
M <i>Bistorta officinalis</i> Delarbe	.	+2	+	I ¹
Espèces à large amplitude											
<i>Agrostis capillaris</i> L.	2,2	1,1	1,1	2,2	2,2	1,1	.	.	.	1,1	IV ¹⁻²
<i>Achillea millefolium</i> L.	.	.	1,1	.	+2	r	.	+	.	.	II ⁻¹
<i>Hieracium</i> <i>Hieracium</i> sect.	+	.	+	1,1	.	+	III ⁻¹
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	.	+2	.	.	+	I ¹
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	1,1	.	.	I ¹
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	1,1	.	.	.	I ¹
Espèces compagnes											
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	+	I ¹
M <i>Allium lusitanicum</i> Lam.	+	I ¹
<i>Serratula tinctoria</i> L.	i	I ¹
M <i>Thesium alpinum</i> L.	.	+	I ¹
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	.	.	r	I ¹
<i>Festuca</i> L.	.	.	2,2	.	1,1	I ¹⁻²
<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al.	+	I ¹
<i>Stellaria graminea</i> L.	+	I ¹
M <i>Centauria nigra</i> L.	+	I ¹
<i>Briza media</i> L.	r	I ¹
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	r	I ¹
M <i>Patzkea paniculata</i> (L.) G.H.Loos	+	.	.	I ¹
P <i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench	+	.	.	I ¹
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	+	.	.	I ¹
<i>Genista sagittalis</i> L.	+	.	.	I ¹
<i>Rumex acetosa</i> L.	i	.	.	I ¹
<i>Leontodon hispidus</i> L.	+	.	I ¹
<i>Viola gr. riviniana</i>	r	.	I ¹