

Trocdario verticillati-Juncetum squarrosi

B. Foucault ex B. Foucault & T. Philippe in J.-M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 *nom. corr.* (art. 44)

	16201	16428	16429	16431	366111	373517	650766	339018	385417	619710	385404	385436	650859	SYNTHESE	
Numéro relevé															
Altitude (m)	790	700	740	680	705	860	nd	860	1 190	1 027	1 050	1 060	1 200	905	
Pente relevé (°)	nd	nd	nd	nd	2	2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
Exposition					N	SO									
Surface (m²)	nd	nd	nd	nd	60	50	15	100	nd	3	nd	nd	nd	46	
Recouvrement total (%)	nd	nd	nd	nd	100	100	100	100	nd	98	nd	nd	nd	100	
Nombre de taxons	28	26	32	22	23	28	22	21	25	27	27	27	27	26	
Combinaison caractéristique															
	<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf.	+	1	+	2	2,2	1,1	+	+	1	1,1	1	1	1	V ⁺²
	<i>Juncus squarrosus</i> L.	2	2	+	+	+1	+1	1	1	1,2	1,2	1,2	+	2	V ⁺²
	<i>Carex panicea</i> L.	+	2	2	1	2,2	2,2	+	1	+	.	1	+	+	V ⁺²
	<i>Nardus stricta</i> L.	2	4	2	3	3,3	4,4	+	1	1,2	2,2	1,2	4	2	V ⁺⁴
	<i>Scorzonera humilis</i> L.	+	+	1	3	r	.	+	1	1	.	1	1	1	IV ⁻³
	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill	.	.	2	2	.	.	+	+	II ⁺²
	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	3	.	1	2	2,2	2,2	4	3	1	.	.	.	1	IV ¹⁻⁴
	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	.	1	1	+	1,1	1,1	1	2	.	2,2	1	.	.	IV ⁺²
M	<i>Epikeros pyrenaicus</i> (L.) Raf.	1	1,1	+	+	1	II ⁺¹
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres															
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	+	1	1	.	2,2	.	+	+	1	.	.	1	1	IV ⁺²
	<i>Succisa pratensis</i> Moench	+	.	.	1	+2	.	2	.	1	1,1	.	1	1	III ⁺²
	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	+	1	2	1	1,2	.	.	+	III ⁺²
	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	.	.	.	+	.	.	+	.	+	.	+	1	+	III ⁺¹
M	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	.	1	1	2,2	.	.	1	II ¹⁻²
	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	1	+	.	.	.	+	II ⁺¹
	<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West	1,2	1	.	.	I ¹
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles															
	<i>Galium saxatile</i> L.	+	+	1	.	2,2	1,2	.	.	1	+2	+	1	1	IV ⁺²
	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	.	1	3	3	2,2	2,2	.	.	.	2,2	.	+	.	III ⁺³
	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	.	2	1	1	1	3,3	+	+	1	III ⁺³
	<i>Briza media</i> L.	+	.	.	.	+1	+1	.	+	.	.	1	+	+	III ⁺¹
	<i>Arnica montana</i> L.	2	.	.	.	1	2	.	II ¹⁻²
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	+	.	.	.	2,2	I ⁺²
Espèces des landes															
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	+	.	1	.	.	1,2	1	+	II ⁺¹
	<i>Erica tetralix</i> L.	+	.	2	.	+2	.	.	+	II ⁺²
	<i>Genista anglica</i> L.	1,2	r	1,2	.	.	II ^{r-1}
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres															
	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	2	1	2	+	2,2	2,2	1	1	1,2	1,1	1	2	2	V ⁺²
	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	.	.	2	2	.	.	2	+	.	.	.	2	.	II ⁺²
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles															
	<i>Carex pilulifera</i> L.	.	1	1	1	.	2,2	+	+	.	1,1	+	.	.	III ⁺²
	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	+	.	1	.	.	+1	.	+	+	.	.	.	+	III ⁺¹
M	<i>Poa chaixii</i> Vill.	1	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles															
	<i>Festuca gr. rubra</i>	1 cf	.	.	.	2,2	.	.	+	.	1,1 cf	.	.	.	II ⁺²
	<i>Veronica officinalis</i> L.	1,2	.	.	.	r	+	+	.	II ^{r-1}
	<i>Ajuga reptans</i> L.	+1	+	+	.	II ⁺
	<i>Narcissus poeticus</i> L.	1	I ¹
Espèces des milieux humides, très maigres à maigres															
	<i>Agrostis canina</i> L.	+	+	.	2	2,2	.	+	.	1	.	.	.	1	III ⁺²
	<i>Carex echinata</i> Murray	.	1	r	1,2	.	1	.	2	II ^{r-2}
	<i>Galium uliginosum</i> L.	+	+	.	I ⁺
	<i>Valeriana dioica</i> L.	.	.	.	1	I ¹
Espèces des milieux humides, très maigres à peu fertiles															
	<i>Viola palustris</i> L.	.	1	.	.	.	1,1	.	.	1	.	.	.	1	II ¹
C	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.	.	.	+	.	.	+2	I ⁺
	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm.	2,2	I ²
	<i>Scutellaria minor</i> Huds.	.	.	.	1	I ¹
Espèces des milieux humides, peu fertiles à fertiles															
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	+1	.	.	.	+	i	.	+	+	II ⁱ⁺⁺
	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	.	+	.	.	.	1,1	+	II ⁺¹
Espèces à large amplitude															
	<i>Holcus lanatus</i> L.	+	2	.	.	2,2	.	+	.	.	+	1	1	.	III ⁺²
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	+	+	.	.	1,1	1,1	.	r	1	.	1	.	1	III ^{r-1}
	<i>Trifolium repens</i> L.	1,1	.	.	.	+2	1	.	.	II ⁺¹

Numéro relevé	16201	16428	16429	16431	366111	373517	650766	339018	385417	619710	385404	385436	650859	SYNTHESE	
	Altitude (m)	790	700	740	680	705	860	nd	860	1 190	1 027	1 050	1 060		1 200
Pente relevé (°)	nd	nd	nd	nd	2	2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
Exposition					N	SO									
Surface (m²)	nd	nd	nd	nd	60	50	15	100	nd	3	nd	nd	nd	nd	46
Recouvrement total (%)	nd	nd	nd	nd	100	100	100	100	nd	98	nd	nd	nd	nd	100
Nombre de taxons	28	26	32	22	23	28	22	21	25	27	27	27	27	26	
<i>Agrostis capillaris</i> L.	+1	1,1	.	.	.	1,1	.	1	.	II ⁺¹	
<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	+	1,1	.	.	.	I ⁺¹	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	1,1	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺¹	
Autres taxons															
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	1	.	I ¹	
<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej.	.	1	+	I ⁺¹	
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	.	.	1	I ¹	
Espèces compagnes															
<i>Pinus sylvestris</i> L.	.	+	I ⁺	
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	r	I ^r	
<i>Trifolium pratense</i> L.	r	I ^r	
<i>Ulex minor</i> Roth	r	I ^r	
R- <i>Angelica sylvestris</i> L.	+	I ⁺	
M <i>Ranunculus serpens</i> Schrank	+	.	.	.	+	I ⁺	
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	+	.	.	.	+	I ⁺	
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	+	.	.	.	+	I ⁺	
<i>Stellaria graminea</i> L.	+	.	.	.	I ⁺	
<i>Lotus corniculatus</i> L.	+2	.	.	.	I ⁺	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	+2	.	.	.	I ⁺	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	+2	.	.	.	I ⁺	
<i>Veronica arvensis</i> L.	r	.	.	.	I ^r	
M <i>Centaurea nigra</i> L.	r	.	.	.	I ^r	
P <i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench	i	.	.	.	I ⁱ	
M <i>Meum athamanticum</i> Jacq.	+	.	.	I ⁺	
<i>Caltha palustris</i> L.	+	.	.	I ⁺	
<i>Myosotis</i> L.	+	.	.	I ⁺	
<i>Carex pallescens</i> L.	+	.	I ⁺	
M <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	+	.	I ⁺	
<i>Rumex acetosa</i> L.	+	.	I ⁺	
<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	+	I ⁺	
Bryophytes															
<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi	+	I ⁺	
<i>Dicranum bonjeanii</i> De Not.	+	I ⁺	
<i>Odontoschisma sphagni</i> (Dicks.) Dumort.	+	I ⁺	
<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.	+	I ⁺	
<i>Sphagnum</i> sp.	2	3	I ²⁻³	
<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.	1	.	2	+	II ⁺²	
<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.	1	.	.	+	I ⁺¹	
<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr.	1	1	I ¹	
<i>Polytrichum commune</i> Hedw.	.	1	I ¹	
<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort.	.	1	I ¹	
<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E.Warnecke	.	+	3	I ⁺³	
<i>Dicranum polysetum</i> Sw. ex anon.	.	.	2	I ²	
<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.	.	.	1	I ¹	
<i>Sphagnum palustre</i> L.	.	.	2	I ²	
<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp.	.	.	+	I ⁺	
<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	.	.	1	I ¹	
<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.	.	.	+	I ⁺	
<i>Thuidium delicatulum</i> (Hedw.) Schimp.	.	.	1	+	I ⁺¹	