

	Numéro relevé	14967	18787	25024	25521	338863	374049	SYNTHESE
Altitude (m)	900	650	750	740	765	680		748
Pente relevé (%)	5	nd	10	3	10	nd		7
Exposition	S		N	ONO				
Surface (m²)	60	nd	nd	10	150	30		63
Recouvrement total (%)	nd	nd	nd	90	95	100		95
Nombre de taxons	14	16	19	26	20	23		20
Combinaison caractéristique								
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	1,2	2	2,1	+	2,2	1		V⁺²
<i>Galium saxatile</i> L.	1,2	1	1,2	1,2	1,2	1		V¹
<i>Festuca rubra</i> L.	3,4	+	.	2,2 cf	4,4	3 cf.		V⁺⁴
<i>Rumex acetosella</i> L.	.	.	+,2	+,2	1,1	+		IV⁺¹
<i>Carex pilulifera</i> L.	.	1	+,2	2,2	,2	.		IV⁺²
<i>Agrostis capillaris</i> L.	1,2	.	.	3,3	2,2	.		III¹⁻³
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres								
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	1,1	+	+,2	.	.	.		III⁺¹
<i>Jasione laevis</i> Lam.	.	.	1,2	r,2	1,1	.		III⁺¹
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	+	.	1,2	.	.	.		II⁺¹
<i>Thymus pulegioides</i> L.	1,2		I¹
Espèces des landes								
<i>Ulex minor</i> Roth	.	1	.	+	,1	+		III⁺¹
<i>Genista pilosa</i> L.	1,1	+	+,2	.	.	r		IV^{r-1}
<i>Genista anglica</i> L.	2,3	+		II⁺²
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	2,3	2	1,2	1,1	.	.		IV⁺²
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles								
<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	.	+	+,2	.	2,3	.		III⁺²
P- <i>Holcus mollis</i> L.	+,2	.	.	.	1,1	.		II⁺¹
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles								
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	.	+	+,2	+	2,2	+		V⁺²
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	1,2	.	.	+	.	.		II⁺¹
<i>Nardus stricta</i> L.	.	1	.	i	.	.		II⁺¹
<i>Arnica montana</i> L.	.	.	1,2	.	.	.		I¹
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles								
<i>Veronica officinalis</i> L.	.	+	.	.	1,1	1		III⁺¹
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	.	.	+,2	+	,1	+		IV[*]
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	+,2	.	,2	+		III[*]
Espèces à large amplitude								
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	.	.	+,2	r,2	,1	.		III^{r+2}
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	.	+	.	+	.	r		III^{r+2}
<i>Achillea millefolium</i> L.	.	.	+	.	,1	.		II[*]
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	1,1	+		II⁺¹
<i>Hypericum humifusum</i> L.	.	.	.	+	.	r		II^{r+2}
Espèces forestières								
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	.	+	.	.	2,2	+		III⁺²
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	.	.	+,2	1,1	.	3		III⁺³
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres								
<i>Juncus squarrosum</i> L.	+,2	.	.	+,2	.	.		II[*]
Espèces annuelles								
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	.	.	.	+	,1	.		II[*]
Espèces compagnes								
<i>Briza media</i> L.	+,2		I⁺
<i>Thymus</i> sect. <i>Serpillum</i> (Mill.) Benth.	.	.	+,2	.	.	.		I⁺
<i>Holcus lanatus</i> L.	.	.	+,2	.	.	.		I⁺
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	.	.	.	+,2	.	.		I⁺
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	.	.	.	+,2	.	.		I⁺
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	.	.	.	+	.	.		I⁺
<i>Betula</i> L.	.	.	.	+	.	.		I⁺
<i>Leontodon</i> L.	.	.	.	+,2	.	.		I⁺
<i>Salix</i> L.	.	.	.	+	.	.		I⁺
<i>Rhinanthus minor</i> L.	.	.	.	i	.	.		i
<i>Carex leporina</i> L.	r	.		I⁺
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	+		I⁺
<i>Erica cinerea</i> L.	+		I⁺
<i>Ceratium fontanum</i> Baumg.	+		I⁺
<i>Trifolium repens</i> L.	+		I⁺
<i>Pilosella</i> Vaill.	+		I⁺
<i>Rubus</i> sect. <i>Rubus</i>	+		I⁺
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	+		I⁺
<i>Stellaria holostea</i> L.	r		I⁺
Bryophytes								
<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.	.	+		I⁺